

FAUNAS LOCALES ARGENTINAS

II

ENUMERACION SISTEMÁTICA DE LAS AVES

DE

CHILECITO

(PROVINCIA DE LA RIOJA — REPÚBLICA ARGENTINA)

COLECCIONADA DURANTE LOS MESES DE MARZO Á MAYO DE 1895

(Expedicion del Director del Museo)

Fam. TURDIDÆ

1. — *Turdus fuscater* D'Orb. et Lafr.

Esta especie, de la que se han coleccionado nueve ejemplares, no es rara en las quintas del pueblo. Entre los traidos se hallan dos pichones que han alcanzado ya el tamaño de los adultos, pero cuyo plumage tiene aún el dibujo de los jóvenes, consistiendo en que sobre la cabeza, la garganta, y las tectrices del ala como las inferiores de la cola, tienen los puntos de los tallos amarillos. El pecho está salpicado con manchas amarillas, que provienen de que cada pluma tiene una mancha transversal de color amarillo y borde negro. El color del demás plumage es el de los adultos.

2. — *Turdus leucomelas* Vieill.

Este ave es escasa en Chilecito, y rara vez se ve algun individuo en las quintas; se han traído dos ejemplares.

Fam. TIMELIIDÆ

3. — *Mimus patagonicus* (Lafr.) Gray.

Las calandrias son abundantes en el mes de Abril cuando llegan los frios; se han preparado diez ejemplares.

Fam. TROGLODYTIDÆ

4. — *Troglodytes furvus* (Gm.) Licht.

Muy comun al rededor de las habitaciones; se prepararon tres ejemplares.

Fam. HIRUNDINIDÆ

5. — *Progne chalybea* (Gm.) Gray.

Vive cerca de las habitaciones. Dos ejemplares.

6. — *Atticora cyanoleuca* Vieill.

Abunda mucho en los lugares pantanosos y donde hay agua; cuatro ejemplares.

Fam. TANAGRIDÆ

7. *Pyranga flava* (Vieill.) Koslowsky.

Este pajarito, tan hermoso por su plumage, se halla en esta localidad, pero es allí como tambien en las demás donde se le ha observado, muy escaso. Se han podido preparar dos machos, de los cuales uno ya tiene en su plumage de adulto un rosado profundo, mientras el otro tiene aun entremezclado ese color con amarillo en las plumas del abdomen.

8. *Tanagra bonariensis* (Gm.) Sel.

Abunda esta especie en las quintas del pueblo, donde come frutas, causando así bastante daño. Lo llaman allí «pecho amarillo». Se han traído siete machos y solo una hembra.

9. *Saltator aurantiirostris* Vieill.

Cuando vienen los frios, aparecen en gran cantidad en las quintas y cercanías del pueblo. Ocho ejemplares.

Fam. FRINGILLIDÆ

10. *Pheucticus aureiventris* (D'Orb. et Lafr.) Sel.

Sumamente raro en esos lugares; se ha observado solo un ejemplar, sin haberlo podido cazar.

11. *Guiraca cyanea* (L.) Sel.

Este bonito pájaro se halla á veces en las viñas de aquel pueblo; se han preparado tres machos y cuatro hembras.

**12. Spermophila analis** (D'Orb.) Sharpe.

Se halla en alrededor de las quintas y á veces en las puntas de cerros; se han traído tres machos y una hembra.

**13. Chrysomitris magellanica** (Vieill.) Hartl.

No muy comun por ahí.

**14. Zonotrichia capensis** (P. L. S. Müller) Koslowsky.

Abundante, como en otros lugares de la República. He restituido el nombre específico más antiguo, segun el artículo XV, p. 59, del « Congrès international de Zoologie de Moscou, » 1893.

**15. Poospiza melanoleuca** (Vieill.) Bp.

Se hallan á veces en las quintas por ahí; se consiguieron cuatro machos y dos hembras.

**16. Poospiza ornata** (Lanlb.) Sel. et Salv.

Muy escasos y donde hay pasto cerca de las quintas se vé á veces algunos; dos ejemplares.

**17. Saltatricuia multicolor** Burn.

Tambien muy escaso, rara vez se ven en las quintas; se han preparado un macho y una hembra.

**18. Diuca minor** Bp.

Este pajarito que solamente se conoce de Patagonia, vive tambien en Chilecito, pero busca los lugares más esteriles y retirados de las poblaciones. Cuatro ejemplares.

Fam. ICTERIDAE

**19. Molothrus bonariensis** (Gm.) Cab.

Es muy comun; se han preparado tres machos y una hembra.

**20. Molothrus badius** (Vieill.) Cab.

Tambien muy comun, prefiere los maizales sobre otras partes; preparados dos machos y una hembra.

Fam. TYRANNIDAE

**21. Taenioptera coronata** (Vieill.) Hartl.

No es raro; se han preparado tres machos y una hembra.

**22. Taenioptera irupero** (Vieill.) Hartl.

Esta hermosa especie es bastante rara en las cercanías del

pueblo donde la llaman «almita»; se ha podido conseguir un solo macho de un blanco luciente.

**23. Taenioptera murina** (D'Orb.) Scl.

Se encuentra en número muy reducido; se han solamente preparado dos machos.

**24. Ochthoeca leucophrys** (D'Orb. et Lafr.) Scl. et Salv.

De este pajarito se han preparado dos ejemplares.

**25. Sisopygis icterophrys** (Vieill.) Cab. et Heine.

Esta especie se halla en parajes arbolados y en las quintas, pero siempre en número muy reducido; se han preparado tres ejemplares de los cuales uno es joven.

**26. Cnipolegus anthracinus** Heine.

Algo mas abundante, tanto en las partes arboladas de los cerros, como en igual lugares de los llanos; se han podido preparar ocho machos y seis hembras.

**27. Machetornis rixosa** (Vieill.) Burm.

De esta especie se ha conseguido un solo ejemplar, sin haberse visto otro.

**28. Stigmatura flavo-cinerea** (Burm.) Scl.

Poco abundante y solamente se halla en países retirados de las habitaciones; los tres ejemplares preparados son hembras.

**29. Serpophaga subcristata** (Vieill.) Cab. et Heine.

Esta especie, que llaman los habitantes de la region «piojito», se halla tambien en Chilecito; se ha traído solo un ejemplar.

**30. Anaeretes parulus** (Kittl.) Cab. et Heine.

Poco abundante viéndose solo en las quintas por entre los arbustos cerca del suelo; se han preparado un macho y una hembra.

**31. Pitangus bolivianus** (Lafr.) Berl. et Iher.

Bastante escaso; aliado al «bien-te-veo»; se han traído dos machos y una hembra.

**32. Hirundinea bellicosa** (Vieill.) D'Orb.

De este pajarito raro, se han podido cazar y preparar dos machos y una hembra; busca los cerros, donde se le ve sobre piedras aisladas.

**33. Empidonomus aurantio-atro-cristatus** (D'Orb. et Lafr.) Sel. et Huds.

Es raro allí, y se le ve solo en lugares bajos. De los ejemplares preparados tres son machos y uno de ellos todavía pichon, cuyo plumaje es el siguiente: encima negrusco; la corta cresta del vértice, negra, algunas plumas en el medio con borde ferruginoso; la cinta ancha que empieza sobre la frente y pasa por sobre los ojos hasta la region occipital, sin unirse en esta, es de un color blanco amarillento sucio; la parte de la frente entremezclada con negro; las tectrices del ala negruscas con borde blanco, en las puntas mas anchas que en los costados; las remeras primarias negruscas con borde exterior ferruginoso; el borde interior blanco cerca de la base; las remeras secundarias con borde exterior mas ancho y de un blanco amarillento. Cola negra con bordes ferruginosos. Debajo, igual al adulto. Este pajarito se acerca tambien mucho á la descripcion del *Empidonomus varius*; pero como el tamaño es igual á los dos de plumaje adulto, hay que considerarlo como el jóven de la especie de los dos adultos.

**34. Tyrannus melancholicus** Vieill.

Se halla en número suficiente en los alrededores del pueblo. Tres ejemplares.

Fam. PHYTOTOMIDÆ

**35. Phytotoma rutila** Vieill.

Como en toda la República, se encuentra en Chilecito solo una especie de esta familia, que se compone de un solo género; se han preparado cuatro machos y una hembra.

Fam. DENDROCOLAPTIDÆ

**36. Upucerthia dumetoria** Geoffr. et D'Orb.

Esta especie llega á Chilecito á fines de Abril, instalándose cerca de las habitaciones, en los terrenos arenosos; se han preparado cuatro machos y dos hembras.

**37. Upucerthia luscina** (Burm.) Sel. et Salv.

Este ave busca siempre los sitios mas solitarios de los cerros y lugares pedregosos; se han podido preparar cuatro machos y dos hembras.

**38. Leptasthenura aegithaloides** (Kittl.) Reichb.

No abunda mucho, pero tampoco no falta en las partes cubiertas de arbustos y árboles; se han preparado cuatro ejemplares.

**39. Siptornis pallida** (Max.) Sel.

Unicamente se halla en los cerros, pero en poca cantidad; se ha preparado uno.

**40. Siptornis orbignii** (Reichb.) Sel.

Habita los cerros, tanto los arbolados como los que carecen de vegetación; preparados tres machos y dos hembras.

**41. Homorus lophotes** Reichb.

Comun en los alrededores de Chilecito, como tambien en las quintas del pueblo; preparados tres machos y dos hembras.

**42. Homorus gutturalis** (D'Orb. et Lafr.) Sel. et Huds.

No es abundante; elige lugares estériles y secos en los llanos, de esta especie se han preparado cuatro ejemplares.

Fam. PTEROPTOCHIDÆ

**43. Rhinocrypta lanceolata** (Geoff. et D'Orb.) Gray.

Busca siempre los lugares donde halla matorrales poco penetrables de arbustos; anda cerca del suelo. Un ejemplar.

Fam. TROCHILIDÆ

**44. Chlorostilbon splendidus** (Vieill.) Elliot.

Este picaflor no es abundante en las cercanias del pueblo; solo se le ve á veces en las quintas. Se han preparado cinco ejemplares.

**45. Sappho sparganura** (Shaw.) Reichb.

De este hermoso picaflor se han traído cincuenta y cuatro ejemplares, en todos los estados de plumaje, y de pichones machos y hembras, lo que indica que esta especie es comun en ese paraje.

**46. Leucippus chionogaster** (Tsch.) Reichb.

Esta especie no es rara en los alrededores de la localidad. Se han preparado cuatro.

**47. Oreotrochilus leucopleurus** Gould.

Esta especie es muy escasa en los alrededores de Chilecito, pero se halla en abundancia en los cerros del Famatina. Se prepararon tres ejemplares de la primera localidad y diez de la segunda.

**48. Patagona gigas** (Vieill.) Bp.

Es muy escaso allí este picaflor gigante. Se ha preparado solo uno.

Fam. CYPSELIDÆ

**49. Micropus andicola** Lafr. et D'Orb.

Esta golondrina no es rara, pero muy difícil para el tiro, pues vive sola en las rocas mas escarpadas y vuela en altura considerable con rápidos movimientos. Se ha truido un ejemplar.

**50. Chaetura Zonaris** (Shaw.) Sel.

Esta golondrina tiene las mismas costumbres de la anterior; tambien vuela durante la noche, gritando de tiempo en tiempo.

Fam. PICIDÆ

**51. Crysoptilus melanochlorus** (Gm.) Hartl.

Este carpintero se halla en Chilecito en abundancia, como en toda la República, tanto en los cerros arbolados como en los bosques de los llanos. Se han preparado tres machos y dos hembras.

**52. Melanerpes cactorum** (Lafr. et D'Orb.) Hargitt.

Muy comun en las quintas y parajes con vegetacion arbórea. Se han preparado dos machos y una hembra.

**53. Dendrocopus lignarius** (Mol.) Hargitt.

De esta especie se ha visto y cazado solo un ejemplar en una quinta; es una hembra.

Fam. CUCULIDÆ

54. *Guira guira* (Gm.) Schelley.

Este pájaro, que llaman vulgarmente «Urraca», es bastante comun en esta localidad. Se ha preparado un ejemplar.

55. *Coccyzus melanocryphus* Vieill.

De esta especie hay muy pocos ejemplares en las cercanias del pueblo. Se han preparado tres hembras.

56. *Coccyzus cinereus* Vieill.

Esta especie parecida á la anterior, es muy rara en Chilecito. Se ha conseguido un ejemplar que es una hembra.

Fam. PSITTACIDÆ

57. *Balborhynchus aymara* (D'Orb.) Souancé.

La cotorrita de la sierra se halla en número bastante considerable en los cerros arbolados de los alrededores del pueblo. Se han preparado dos machos y dos hembras.

58. *Cyanolyseus patagonus* (Vieill.) Salvadori.

El loro barranquero tambien se halla allí en gran cantidad como en los demás lugares donde vive. Los ejemplares son muy grandes y alcanzan las medidas del loro barranquero de Chile *Cyanolyseus cyanolyseus* (Mol.) Koslowsky. No puedo todavía afirmar si es el mismo loro ó el comun de este país. Se han preparado cuatro.

Fam. STRIGIDÆ

59. *Speotyto cunicularia* (Mol.) Sharpe.

Esta lechuza es bastante comun. Se han obtenido dos hembras.

Fam. FALCONIDÆ

60. *Tinnunculus cinnamominus* (Swains.) Gray.

Esta especie de alcon abunda en los alrededores de las poblaciones; se nutre de langostas y lagartijas, persiguiendo rara vez pajaritos. Se han preparado ocho hembras y un macho.



**61. Spizapteryx circumcinctus** Kaup.

Se le ve á esta especie en las puntas de los árboles más altos observando su alrededor; evita los cerros. Se han preparado un macho y una hembra.

**62. Falco fusco-caerulescens** Vieill.

Tampoco falta este alcon en las cercanías del pueblo. Se ha preparado una hembra.

**63. Buteo albicaudatus** Vieill.

Este alcon grande observa sus alrededores, generalmente desde las rocas más altas y sin vegetación. Su presa consiste allí en conejos y ratones; es bastante escaso. Se han preparado un macho y una hembra.

**64. Buteo erythronotus** (King) Darw.

Esta hermosa especie de alcon se ve de tiempo en tiempo circular en el aire, distinguiéndose fácilmente por su pecho blanco y la faja negra en la punta de la cola.

Se han preparado dos ejemplares machos.

**65. Geranoaëtus melanoleucus** (Vieill.) Strickl.

Se ve á veces girar á esta águila en el aire. Se ha preparado un macho.

**66. Polyborus tharus** (Mol.) Strickl.

El carancho es algo escaso en Chilecito, pero no deja de mostrarse de tiempo en tiempo cerca de las casas; se ha preparado un ejemplar que es muy oscuro y de un solo color por encima.

**67. Milvago chimango** (Vieill.) Darw.

Tambien el chimango frecuenta estos lugares, pero siempre en reducido número.

Fam. CATHARTIDÆ

**68. Cathartes aura** (L.) Illig.

De esta especie y de la siguiente hay gran cantidad allí, se tiene siempre en los cerros más altos, desde donde bajan para devorar animales muertos en los llanos. Se han preparado cuatro ejemplares.

**69. *Cathartes atratus*** (Bartram) Sw. et Rich.

Es algo menos abundante que la especie precedente. Se ha traído un ejemplar.

**70. *Sarcorhamphus gryphus*** (L.) Steph.

Se les ve volar á veces en número considerable, circulando hasta ochenta individuos sobre el lugar donde han descubierto alguna mula muerta; se ha preparado un solo ejemplar.

Fam. ANATIDÆ

**71. *Dafila spinicauda*** (Vieill.) Bp.

Este pato ha sido el único de su familia, que se ha observado durante el viaje del señor Director del Museo, pero hay que suponer que otras especies frecuentan también los sitios donde se halla algun charco, aun cuando no se encuentren en todas las estaciones. Se ha preparado solo un ejemplar.

Fam. COLUMBIDÆ

**72. *Columba maculosa*** Temm.

Abunda en las cercanías del pueblo, como en todas partes donde se hallan árboles y arbustos, la paloma grande con co-bijas manchadas. Se han preparado dos hembras.

**73. *Zenaida auriculata*** (Des Murs) Bp.

La paloma torcaz se halla en abundancia en todos los lugares de los alrededores del pueblo. Se han preparado tres machos y una hembra.

**74. *Columbula picui*** (Temm.) Bp.

La torcacita ó el «picui» se ha cazado también en Chilecito, donde no es escasa; se ha preparado un macho.

**75. *Gymnopelia erythrothorax*** (Meyen) Sel. et Salv.

Esta palomita se ha encontrado por primera vez en territorio argentino y fueron cazadas dos entre La Rioja y Chilecito en el camino. Hasta ahora se conocía esta única especie del género del Perú y Bolivia, donde es también rara.

**76. *Metriopelia melanoptera*** (Mol.) Bp.

De esta paloma que vive cerca de las cordilleras, se han preparado dos ejemplares, cazados en los alrededores del pueblo.

**77. *Metriopelia aymara* (D'Orb.) Bp.**

Esta especie, que vive en mas abundancia en las cordilleras al Norte y Oeste de Chilecito, se ha señalado tambien en esta localidad. Se han preparado tres ejemplares.

Fam. TINAMIDÆ

**78. *Colodromas elegans* (D'Orb. et Geoff.) Scl. et Salv.**

La martineta copetona existe tambien en estos lugares, donde se ha cazado y preparado un ejemplar.

**79. *Nothoprocta cinerascens* (Burm.) Cab.**

Esta especie de perdiz que llaman en Chilecito «Martineta», se halla tambien en las cercantas del pueblo, donde se ha cazado y preparado dos ejemplares; hasta ahora se la conocea en Córdoba y Tucuman.

El total de pieles de aves preparadas en Chilecito y recibidas en el Museo por el que suscribe para ser catalogadas, es de trescientas seis.

Junio 1º de 1895.

JULIO KOSŁOWSKY

Naturalista viajero del Museo de La Plata.

---

# A V E S

RECOGIDAS EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA

(REPÚBLICA ARGENTINA)

DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 1895

(*Expedición del Director del Museo*)

---

Fam. TURDIDÆ

1. **Turdus fuscater** D'Orb. et Lafr.

En valles donde hay agua y árboles, no es muy escasa; tres ejemplares.

Fam. TIMELIDÆ

2. **Mimus triurus** (Vieill.) Harl.

En los llanos, al pié de las montañas, escaso; dos ejemplares.

Fam. MNOTILTIDÆ

3. **Setophaga bruneiceps** D'Orb. et Lafr.

De este pajarito de movimientos ágiles, se consiguió solo un ejemplar.

Fam. HIRUNDINIDÆ

4. **Tachycineta leucorrhoa** (Vieill.) Sharpe.

Se halla con frecuencia en toda la provincia, con excepcion de las serranías altas; un ejemplar.

5. **Atticora cyanofoea** (Vieill.) Cab.

Tambien muy comun; dos ejemplares.

Fam. TANAGRIDÆ

6. *Tanagra bonariensis* (Gm.) Scl.

Se halla á menudo en toda la provincia; tres ejemplares.

7. *Piranga flava* (Vieill.) Koslowsky.

Escaso en todas partes y se halla solamente en los cerros bajos con vegetacion; un ejemplar.

Fam. FRINGILLIDÆ

8. *Pheucticus aureiventris* (D'Orb. et Lafr.) Scl.

Es bastante raro; solo se ha visto un ejemplar que fué cazado.

9. *Guiraca cyanea* (L.) Scl.

Se halla con bastante frecuencia en todos los lugares, pero siempre en corto número; dos ejemplares.

10. *Phrygilus gayi* (Eydt. et Gerv.) Bp.

Este pajarito, que habita á los dos lados de los Andes, se halla con frecuencia en los lugares montañosos de la provincia.

11. *Saltatricula multicolor* Burm.

Este pajarito fué hallado rara vez en el viaje y se consiguió solo un ejemplar.

12. *Chrysomitris atrata* (D'Orb. et Lafr.) Bp.

De esta especie que es bastante rara, se ha conseguido tres ejemplares.

Fam. TYRANNIDÆ

13. *Taenioptera coronata* (Vieill.) Hartl.

Bastante comun; un ejemplar.

14. *Taenioptera murina* (D'Orb. et Lafr.) Scl.

De esta especie se han coleccionado dos ejemplares.

15. *Anaerotes parulus* (Kittl.) Cab. et Heine.

Se han preparado dos individuos de este pequeño pajarito.

16. *Myiarchus tyrannulus* (Müll.) White.

Muy escaso; solo se ha conseguido un ejemplar.

17. *Empidonomus aurantio-atro-cristatus* (D'Orb. et Lafre.) ScL. et Huds.

No es abundante; un ejemplar.

Fam. ICTERIDÆ

18. *Trupialis militaris* (L.) Bp.

El pecho colorado estiendo sus paraderos hasta esta provincia, siendo un habitante de la Patagonia y demuestra como tambien otras aves cazadas en Catamarca y que viven donde las condiciones de clima son iguales. Agregaré que las tectrices inferiores del ala son blancas, para que no se crea que esta ave se ha confundido con el *Trupialis defilippii*, cuyas plumas son negras en igual lugar.

Se ha observado por primera vez esta especie al norte. Un ejemplar macho preparado.

Fam. DENDROCOLAPTIDÆ

19. *Geositta isabellina* (Pl. et Landb.) ScL.

Este pájaro se observa la primera vez en la República; se ha preparado un ejemplar.

20. *Synallaxis Whitei* ScL.

Muy escaso; un solo ejemplar se ha coleccionado.

21. *Homorus lophotes*, Reichenb.

En los lugares bajos y con vegetacion; un ejemplar.

Fam. TROCHILIDÆ

22. *Sappho sparganura* (Lesson.) Reichb.

Bastante comun; seis ejemplares.

Fam. PICIDÆ

23. *Colaptes agricola* (Math.) ScL.

Comun en los campos, dos ejemplares.

Fam. FALCONIDÆ

24. *Polyborus tharus* (Mol.) Strickl.

El carancho que se trajo de esta provincia, tiene un color muy oscuro sobre la cabeza y espalda, igual al traído de Chiccito.

Fam. ARDEIDÆ

**25. Nycticorax obscurus**, Bp.

Este soco fué observado en las sierras más pobres de agua, donde paseaba sobre las rocas; se habria extraviado probablemente un ejemplar.

Fam. PHOENICOPTERIDÆ

**26. Phoenicoparrus andinus** (Philippi) Bp.

Este flamenco, que posee solamente tres dedos, no puede continuar en el género *Phenicopterus*, género que fué creado para los flamencos del viejo mundo, y sobre todo para los que poseen cuatro dedos. El otro flamenco de los Andes, el *Ph. jamesi*, pongo tambien en este género creado justamente por Bonaparte, pues si bien este ornitólogo se basó solamente en las diferencias del pico, aceptó el mismo género para los que poseen únicamente tres dedos. Del *Ph. andinus* fueron traídas cuatro pieles y tres esqueletos.

Fam. ANATIDÆ

**27 Bernicla melanoptera** (Eyton.)

Estas abutardas se hallan en número bastante considerable en las pequeñas lagunas y manantiales de las cordilleras altas de la provincia; se han coleccionado cuatro ejemplares.

Fam. THINOCORIDÆ

**28. Thinocorus orbignyana** Geoffr. et Less.

Del «Tinocoro» se han coleccionado seis ejemplares en todos los estados de plumaje.

**29. Attagis Latreillii** Less.

De esta «perdiz de la cordillera» se han traído seis ejemplares que no se distinguen en nada de los que posee el Museo, de Santa Cruz (Patagonia). Esta ave se halla en toda la cordillera, desde Tierra del Fuego hasta Bolivia, y no me cabe duda que el *A. chimboraxensis* es la misma ave ó una variedad de ésta.

Junio 3 de 1895.

JULIO KOSLOWSKY.

Naturalista viajero del Museo de La Plata.