

Dos nuevas Lagartijas de la Provincia de Buenos Aires

POA

JULIO KOSLOWSKY

Naturalista Viajero del Museo de La Plata

(CON DOS LÁMINAS)

Ocupado con la revisión y clasificación de la rica colección de reptiles de este Museo encontré dos lagartijas del género *Anisolepis* que se diferencian notablemente entre sí lo mismo que de la especie conocida de Rio Grande do Sul: *A. Iberingii* Blgr.

Una de estas fué cazada por el señor Carlos Bruch en Punta Lara sobre el follage de arbustos, en el mes de Diciembre de 1894, y la otra se encuentra en la colección como precedente de la Sierra de la Ventana, cerca de Bahía Blanca.

Anisolepis Bruchi, Koslowsky (Lám. I.)

La cabeza pequeña, cuerpo redondo y alargado; dientes laterales tricúspidos. Abertura de las narices laterales cerca de la punta del hocico; las aberturas de las orejas moderadamente grandes y ovales. Dedos lateralmente denticulados y con escamas lisas en su parte inferior. Las escamas sobre la cabeza, pequeñas, lisas y algo convexas, poseyendo algunas una quilla poco pronunciada; las mas pequeñas son las supraoculares que poseen una série de seis á siete escamas algo mayores. Sobre la region occipital se hallan cinco escamas mas grandes subovales, simétricamente repartidas entre las demás, de modo que las tres primeras están colocadas en línea transversal, separadas una de la otra por una escama mas pequeña, siendo la mayor de las tres la que queda en el medio de la cabeza, de tamaño del tímpano; las otras dos de las cinco escamas quedan

más atrás, están también colocadas en una línea y separadas de las tres anteriores por dos hileras de escamas pequeñas; las cinco escamas son muy rugosas como también las que se hallan sobre el espacio inter-orbital. Posée nueve escamas labiales superiores y diez inferiores, que son muy bajas y alargadas. Las escamas de la garganta son granulares y lisas en la parte anterior, y pasan poco á poco á ser romboidales, provistas con una quilla y agrandándose gradualmente hácia el pliegue gular que es fuertemente marcado por pequeñas escamas granulares. Las escamas dorsales son, sobre la region vertebral, irregulares, mas grandes, imbricadas y provistas con una quilla bien pronunciada, y sobre éstas siguen unas tres ó cuatro series de escamas mas pequeñas, también imbricadas y provistas con quilla, agregándose á éstas otra vez mas grandes, como las de la region vertebral, arregladas en dos hileras irregulares. Las escamas dorso-laterales son muy pequeñas, algo imbricadas y provistas con quilla, teniendo además distribuido entre si algunas escamas mas grandes; á cada lado se halla una hilera de escamas mas grandes imbricadas con quillas fuertemente pronunciadas, las que empiezan un centímetro detrás la áxila de la pierna anterior y vá en línea derecha hasta la ingle de la pierna posterior. Las escamas ventrales son mas grandes que las dorsales, romboidales, iguales, con fuerte quilla que forma líneas derechas continuas é imbricadas. La cola es redonda, algo mas alta que ancha, y cubierta con escamas romboidales imbricadas y provistas con quillas. La pierna posterior doblada al cuerpo alcanza hasta la axila ó el hombro de la pierna anterior. La cola es dos veces y media tan larga como el cuerpo con cabeza. Por encima de la region vertebral del cuerpo, la que es de un color habana que principia sobre la region occipital y vá hasta sobre la primera parte de la cola, corre á cada lado de la region dorsal una faja de color blanco crema, la que principia desde los ojos y se prolonga sobre la primera parte de la cola acompañando el color habana; los costados son de un color marron claro con pintas negras muy finas; esta parte está dividida por una línea blanca cerca del vientre la que está formada por la hilera de las escamas grandes; por el ojo pasa una línea muy fina que vá tocando el borde superior de la oreja hasta el omóplato; debajo es de color blanco con muy finos tisnes sobre la garganta. Largo total 285 mm.

Cabeza, 18 mm.; cuerpo, 63 mm.; cola, 205 mm.; pata anterior, 30 mm.; pierna posterior, 45 mm. El único ejemplar que sirvió para la descripción es una hembra.

Anisolepis argentinus, Koslowsky (Lám. II.)


Cabeza pequeña, cuerpo redondo y alargado. Dientes laterales tricuspídos. Aberturas de las narices laterales y situadas cerca de la punta del hocico. Aberturas de las orejas triangulares y muy pequeñas. Los dedos provistos con denticulación lateral y con escamas lisas en su parte inferior. Las escamas sobre la cabeza son pequeñas y lisas, y algunas también son rugosas; las supraoculares son las más pequeñas, y las de la región occipital son más pequeñas que las de sobre el hocico y de tamaño del tímpano; posee ocho ó nueve escamas labiales superiores y trece inferiores, siendo las tres últimas de estas pseudolabiales, todas son muy bajas y alargadas. Las escamas de la garganta son granulares y lisas, pasando poco á poco en escamas imbricadas, romboidales y provistas de quillas que siguen sin interrupción hasta el vientre; la garganta no posee ningún vestigio de pliegue. Las escamas dorsales son más grandes y provistas con quillas, de tamaño irregular é imbricadas; las tres á cuatro hileras sobre la región vertebral son las más grandes. Las escamas dorso-laterales son pequeñas, granulares con quilla y casi todas del mismo tamaño, solamente cerca del vientre se notan algunas más grandes entre las pequeñas des-parramadas; las ventrales son grandes, romboidales, imbricadas, provistas con quillas que forman líneas derechas continuas. La pierna posterior doblada al cuerpo alcanza la axila de la pierna anterior. La cola es más que tres veces tan larga como el cuerpo con cabeza, y cubierta con escamas imbricadas iguales con quillas que forman líneas derechas continuas, formando las escamas también hileras transversales en diagonal. Por encima es de un color gris brunáceo ó de ceniza, con dos líneas ó fajas paralelas, algo onduladas en su borde exterior que es de un color habana negruzco; estas fajas principian sobre la región occipital, pasan por el dorso y van hasta la cola donde se convierten siempre en dos tiznes cortos que van también paralelos hasta la punta de la cola, siendo el color de ellos más oscuro que sobre las espaldas. La cabeza posee tres líneas; una principia desde las aberturas de las narices, pasa sobre el borde de las escamas supraoculares y vá hasta la región occipital y esta línea está formada por pintitas negras muy finas; la otra línea principia también desde las aberturas de las narices, pasa por el medio del ojo y no alcanza la altura de la oreja; la tercera línea principia debajo del borde posterior del ojo, pasa por el borde superior de la oreja y vá hasta el

omó-plato; esta es la línea mas pronunciada de las tres de la cabeza.


Por debajo es de un color blanco con pequeños tiznes color habana-oscuro sobre la garganta; las piernas anteriores y posteriores poseen por encima unos tiznes color habana-oscuro.

Largo total, 330 mm.; cabeza, 12 mm.; cuerpo, 60 mm.; cola, 258 mm.; pierna anterior 27 mm.; pierna posterior, 43 mm.

Octubre 1º de 1895.



ANISOLEPIS BRUCHI n. sp.



ANISOLEPIS ARGENTINUS n. sp.