

QUELQUES CLAVICORNES NOUVEAUX

DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Recueillis par M. CHARLES BRUCH

PAR

A. GROUVELLE

Byturus meridionalis n. sp.

Elongato-ovatus, convexus, rufo-testaceus, dense flavo-albido-piloso-squamosus: oculis magnis; prothorace transverso, antice angustato, lateribus rotundatis. basin versus intus sinuatis, angulis anticis obtusis. subhebetatis, posticis acutis: elytris paulo latioribus quam prothorace. Long. 4 mill.

Allongé, ovale, convexe, roux-testacé, couvert d'une pubescence couchée formée de poils blancs-jaunâtres, assez longs, assez épais, ne masquant pas complètement la couleur du tégument, disposés par groupe présentant un point de convergence. Yeux gros. Prothorax un peu plus de une fois et demie aussi long que large, rétréci en avant; bords latéraux arrondis en avant, sinués en dedans en avant des angles postérieurs; angles antérieurs obtus, subémoussés, postérieurs aigus; marges latérales largement déprimées vers les angles postérieurs; pubescence discoïdale ne présentant pas une direction de convergence très accentuée vers l'écusson. Elytres un peu plus de deux fois plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur.

République Argentine (Gob. Chubut).

Brachyterus nigropiceus n. sp.

Oratus, convexus, nitidus, albido-grisco-pubescentis, niger: antennis rufis, elytris piceis, pedibus rufo-piceis; capite prothoraceque dense fortiterque punctatis; angulis posticis prothoracis obtusis. margine basilarum utrinque ad angulos submarginata; scutello subtrapeziformi, dense punctato; elytris sicut prothorace punctatis, margine apicali alutaceo. Long. 2 mill.

Oblong, convexe, brillant, densément et fortement ponctué, couvert d'une pubescence couchée d'un gris blanchâtre, assez dense; tête, pro-

thorax et segments apparents de l'abdomen noirs; antennes rougeâtres, élytres brun de poix, pattes plus claires. Prothorax moins long que large dans sa plus grande largeur, rétréci en avant; côtés arrondis, base rebordée, arquée en arrière, faiblement échancrée de chaque côté vers les extrémités; angles postérieurs obtus, presque marqués. Écusson sub-trapeziforme. Elytres plus larges à la base que le prothorax, environ aussi longs que larges ensemble, tronqués obliquement au sommet; extrême marge apicale à peine ponctuée, alutacée; segments apparents de l'abdomen alutacés, plus finement et moins densément ponctués que les élytres, plus densément pubescents.

République Argentine (Province de Buenos Ayres).

Colastus Bruchi n. sp.

Ovatus sat latus, vix convexus, nitidus, fulvo-pubescent, rufus; clava antennarum et apice elytrorum nigricantibus; capite sat dense punctato; prothorace transversissimo, antice angustato in disco sat parce punctato; elytris lineato-punctatis; segmentis conspicuis abdominis dense punctatis, punctis minoribus quam illis prothoracis. Long. 5 mill. à 6 mill.

Ovale, assez large à peine convexe, brillant, couvert d'une pubescence fauve, assez longue, mais peu dense sur le prothorax, plus courte sur les élytres, rougeâtre avec la massue des antennes et le sommet des élytres noirs. Tête assez densément ponctuée. Prothorax très transversal, régulièrement rétréci de la base au sommet; côtés arrondis; ponctuation peu serrée sur le disque, plus dense sur les côtés. Écusson presque lisse au sommet. Elytres s'élargissant un peu vers le sommet, ne continuant pas latéralement la courbure des côtés du prothorax, ponctués en lignes; ponctuation confuse dans la région des angles apicaux externes. Segments visibles de l'abdomen densément ponctués; ponctuation moins forte que celle des élytres. Tibias antérieurs du mâle droits.

Brésil (Espírito Santo, Rio de Janeiro); République Argentine (Gob. Misiones).

Stelidota meridionalis n. sp.

Ovata, convexa, nitida, rufo-ferruginea, flavo-pubescent; capite prothoraceque dense et sat fortiter punctatis; elytris lineato-punctatis, intervallis in disco haud elevatis, unilineato-pubescentibus; lateribus prothoracis elytrorumque vix marginato reflexis; tibiis posticis maris rectis. Long. 2 mill.

Ovale, convexe, brillant, roux ferrugineux, garni d'une pubescence flave, couchée, assez longue et peu dense sur le prothorax, disposé en ligne sur les intervalles des stries des élytres. Tête et prothorax dense-

ment et assez fortement ponctués. Prothorax rétréci en avant, à peine deux fois plus large à la base que long, à peine rebordé, explané sur les côtés. Elytres environ une fois et un quart plus long; que larges ensemble dans leur plus grande largeur, ponctués en lignes, à peine substriés sur le disque, plus fortement au sommet; intervalles des lignes ponctués avec une ligne de petits points cachés, lorsque l'insecte est frais, sous une ligne pubescente, plans sur le disque, subcaréniformes vers le sommet, points des stries assez gros, mais superficiels. Tibias postérieurs du mâle droits.

République Argentine (Province de Tucuman).

Stelidota trimaculata n. sp.

Ovata, convexa, vix nitida, fulvo-pubescentis, nigro-picea, ochraceo variegata, antennis clava excepta pedibusque fulvo-testaceis; capite prothoraceque praecipue ad latera sat dense asperoso-punctatis; capite antice biimpresso et rufo-marginato; prothorace transverso, antice angustato, lateribus rotundatis, haud explanatis, fulvo-marginatis, basi marginata; elytris ovatis, ad apicem separatim rotundatis, ad latera strictissime emarginatis, lineato-pubescentibus, lineis ad apicem elevatis, intervallis linearum uni-striato-punctatis, singulo elytro ochraceo tri-maculato, 1^a macula basilari subhumerali, 2^a basilari, elongata, juxta basin dilatata, 3^a transversa ad ultimam tertiam partem sita; tibiis posticis maris rectis. Long. 2 $\frac{1}{2}$ mill.

Ovale, convexe, à peine brillant, brun de poix, varié de taches jaunes, couvert d'une pubescence flave-dorée disposée sur les élytres en lignes bien définies. Antennes sauf la massue et pattes fauves-testacés; 2^{me} article de la massue des antennes plus large que le 1^{er} et le 3^{me}. Tête et prothorax couvert d'une ponctuation rapeuse plus dense sur les côtés de ce dernier. Tête bordée de roux en avant, biimpressionnée. Prothorax rétréci de la base au sommet, arrondi sur les côtés, environ deux fois plus long que large à la base; sommet emarginé, côtés non explanés, bordés de fauve; base rebordée. Elytres ovales, arrondis séparément au sommet, présentant leur plus grande largeur vers le premier tiers basilaire, environ une fois et un tiers plus longs que larges dans leur plus grande largeur, striés ponctués; intervalles des stries chargés d'une ligne pubescente très nette, caréniformes dans la région apicale; bords latéraux des élytres très étroitement explanés; sur chaque élytre trois taches jaunes; la 1^{re} basilaire subhumérale, oblongue, la 2^{me} basilaire, contre l'écusson, allongée, dilatée extérieurement dans la partie basilaire, la 3^{me} vers le dernier tiers de la longueur, transversale. Tibias postérieurs des mâles droits.

République Argentine (Gob. Misiones).

Lobiopa marginata n. sp.

Oblonga, sat elongata, modice convexa, nitidula, rufo-testacea, saepe nigro-variegata, parce breviterque flavo-aureo setosa; capite prothoraceque dense tenuiterque punctatis; marginibus lateralibus prothoracis elytrorumque late concavis; punctis elytrorum majoribus quam illis prothoracis. Long. 4 mill.

Oblong, assez allongé, modérément convexe, un peu brillant, roux testacé, souvent varié de noir sur les élytres. Pubescence rare, très espacée, entremêlée de soies d'un flave doré, très espacées, inclinées-recourbées en arrière. Tête et prothorax finement et densément ponctués, élytres plus fortement. Marges latérales du prothorax et des élytres largement concaves. Taches noires des élytres comprenant, chez un exemplaire à coloration très nette une bordure plus ou moins coupée contre le rebord interne de la marge latérale concave, une tache basilaire vers le milieu de la largeur de chaque élytre et trois taches subsuturales: la 1^{re} près de l'écusson, la 2^{me} vers le tiers basilaire et la 3^{me} plus ou moins développée latéralement vers le 2^{me} tiers.

République Argentine (Buenos Ayres).

Cychramus Bruchi n. sp.

Breviter ovatus, convexus, nitidulus, rufo-ferrugineus; dense flavo-pubescentis, dense punctatus; elytris longioribus quam simulatis, humeris obtusis haud oblique truncatis. Long. 5 mill.

Espèce distincte par la ponctuation beaucoup plus forte de ses élytres et par les angles huméraux des élytres à peine obtus, marqués.

République Argentine (Gob. Chubut).

Camptodes Bruchi n. sp.

Breviter oblongus, convexus, nitidus, rufus; scutello, elytris, pygidio, abdomineque nigris; capite prothorace scutelloque alutaceis, parce punctulatis; elytris substriatis, intervallis striarum sat fortiter punctatis, stria suturali subintegra, ab sutura remota; unguiculis tarsarum dentatis.

Mas. elytris ad apicem separatim rotundato-productis, testaceo marginatis. Long. 3 mill.

Courtement oblong, convexe, brillant, roux ferrugineux; écusson, élytres, pygidium et segment de l'abdomen noirs. Tête, prothorax et écusson alutacés, éparsément et finement ponctués. Écusson triangu-

laire. Elytres environ aussi longs que larges; vaguement rougeâtres sur le disque, striés; intervalles des stries fortement ponctués; strie suturale presque entière, contiguë à la suture. Crochets des tarsi dentés à la base. Elytres du mâle terminés au sommet, chacun par un lobe concave, saillant testacé. Pygidium finement pointillé.

République Argentine (Province de Tucuman).

Cerylon laterale n. sp.

Oblongum, convexum, nitidum, castaneum, glabrum; antennis gracilibus, 2° articulo elongato, 3° quadrato, clava oblonga; capite parce punctato, prothorace transverso, antice angustato, haud dense punctato. angulis anticis subrotundatis, basi marginata; scutello laevi; elytris lineato-punctatis, punctis ad latera et ad apicem evanescentibus. Long. $1\frac{1}{8}$ mill

Oblong, convexe, brillant, marron, glabre; antennes grêles; 2^{me} article allongé, 3^{me} carré; massue oblongue partagée transversalement en trois zones: la 1^{re} lisse, les deux dernières pubescentes. Tête éparsément ponctuée. Prothorax environ une fois et demie aussi large que long, parallèle à la base, rétréci arqué ensuite vers le sommet, moins éparsément et plus fortement ponctué que la tête; angles antérieurs presque arrondis; base rebordée. Écusson lisse. Elytres presque deux fois aussi longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur, peu élargis latéralement, ponctués en lignes; lignes de points s'atténuant au sommet et sur les côtés; strie suturale entière, enfoncée au sommet.

République Argentine (Province de Buenos Ayres).

Telephanus Bruchi n. sp.

Oblongo elongatus, convexus, nitidulus, griseo-pubescentis; antennis fulvo-testaceis, 2° et 3° articulis subaequalibus; capite fulvo-testaceo leviter infuscato, dense punctato angulis posticis late rotundatis; prothorace minus fusco quam capite, subquadrato, basin versus parum angustato, dense punctato, lateribus obtuse denticulatis; elytris testaceo-castaneis, punctato-striatis, intervallis striarum in disco angustioribus quam punctis. Long. 5 mill.

Oblong, allongé, convexe, un peu brillant, couvert d'une pubescence grise. Antennes concolores, fauves peu foncées, 2^{me} et 3^{me} articles sub-égaux. Tête fauve légèrement enfermée, densément ponctuée, striée entre les naissances des antennes; angles postérieurs largement arrondis. Prothorax sensiblement aussi long que large dans sa plus grande largeur, parallèle dans la moitié antérieure, un peu rétréci dans la moitié basilaire, sensiblement coloré comme la tête, un peu plus éparsément pon-

tués; côtés garnis de quelques denticules obtus, espacés sauf vers l'extrémité antérieure. Elytres ovales, environ deux fois plus larges à la base que le prothorax et deux fois et demie plus longs que larges ensemble dans la plus grande largeur, ponctués-striés; intervalles des stries plus étroits que les points sur le disque; stries et points s'atténuant vers l'extrémité. Pattes sensiblement colorés comme les antennes.

République Argentine (Province de Buenos Ayres).

Diplocoelus villosus n. sp.

Oblongus, convexus, nitidus, fusco-piceus, pubis elongatis, erectis, vix inclinatis, sat dense vestitus; antennis rufo-piceis; capite grosse et sat dense punctato, utrinque in longitudinem breviter carinato et impresso, vertice foveolato; prothorace transversissimo, antice angustato, basin versus parallelo, ad latera dense fortiterque punctato, margine antico late et haud profunde emarginato, medio haud carinato, lateribus stricte pubrinatis, disco in longitudinem subimpresso, utrinque antice arcuatim carinato, carina cum margine antico juncta; elytris striato-punctatis, striis dorsualibus in disco minus impressis, stria suturali ad apicem fortiter impressa; pedibus rufo-fuscis, tibiis anticis ad basin haud emarginatis. Long. $5\frac{1}{2}$ mill.

Oblong, convexe, brillant, brun de poix, couvert d'une pubescence fauve, dressée, un peu inclinée en arrière, longue, entremêlé: de poils plus petits, plus serrés et plus grisâtres. Antennes roux de poix, épaisses, 2^{me} article carré. Tête fortement et assez densément ponctuée; de chaque côté vers la naissance de l'antenne une courte carène longitudinale, limitant en dedans une forte impression; sur le vertex une impression profonde séparée de chaque côté des impressions antérieures par un court intervalle caréniforme. Prothorax plus de deux fois plus large que long, parallèle à la base, arrondi, rétréci en avant; bord antérieur largement et peu profondément échancré; bourrelet apical largement effacé dans le milieu réduit de chaque côté à une courte carène arquée; bourrelet des bords latéraux moyen; disque longitudinalement subimpressionné, éparsement et assez fortement ponctué en avant et à la base, presque lisse au milieu; marges latérales densément ponctués. Elytres environ deux fois aussi longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur, ponctués-striés; stries dorsales moins accentuées sur le disque; strie suturale fortement enfoncée vers le sommet; intervalles des stries larges, plans avec une ligne de petits points. Pattes plus claires que les antennes.

Paraguay (San Pedro).

Diplocoelus turbinatus n. sp.

Oblongus, modice convexus, nitidulus, castaneus, sat dense flavo-pubescentis; antennis haud incrassatis, 2° articulo subelongato: capite parce punctato, haud impresso; prothorace transversissimo, antice angustato, ad basin parallelo, in disco parvissime, ad latera fortiter denseque punctato, apice utrinque sinuato, medio haud pulvinato-carinato, basi utrinque sat late et sat fortiter emarginata, lateribus stricte marginatis, disco antice utrinque breviter arcuatim carinato; elytris punctato-lineatis, punctis in disco evanescentibus, ad latera elongatis, intervallis linearum punctorum sat latis, stria suturali ad apicem fortiter impressa. Long. 2 mill.

Oblong, médiocrement convexe, un peu brillant, marron peu foncé, couvert d'une pubescence flave, assez dense, presque couchée. Antennes assez grêles, 2^{me} article plus long que large, dernier article tronqué, terminé par un petit bouton saillant. Tête non impressionnée. Prothorax un peu plus de deux fois plus large à la base que long, parallèle à la base, arqué, rétréci en avant; bord antérieur sinué de chaque côté bourrelet marginal effacé dans le milieu, réduit de chaque côté à une courte carène arquée en dedans; base largement et assez fortement sinuée de chaque côté; bourrelets marginaux des bords latéraux peu accentués; ponctuation presque nulle sur le disque, éparses en avant et à la base dans la région médiane, plus dense et plus forte sur les côtés. Elytres moins de deux fois plus longs que larges dans leur plus grande largeur acuminés ensemble au sommet, ponctués en lignes; points allongés, lignes ponctuées effacées sur le disque; intervalles des lignes ponctués assez larges; strie suturale bien marquée vers le sommet.

République Argentine (Tucuman).

Diplocaelus consobrinus n. sp.

Oblongo-elongatus, fere parallelus, convexus, castaneus, flavo-pubescentis; antennis crassis, 2° articulo quadrato, ultimo articulo subgloboso, angustiore quam praecedenti; capite depresso, parce punctato, antice oblique biimpresso; prothorace transverso, subparallelo, ad angulos anticos arcuatim angustato, apice utrinque subsinuato, angulis anticis subrectis, productis, basi utrinque subsinuata, angulis posticis acutis, extus oblique subproductis, disco parce grosseque punctato, marginibus lateralibus sat dense grosseque punctatis, in longitudinem carinatis, oris crenulatis, stricte pulvinato-marginatis; elytris sat elongatis, lineato-punctatis, punctis in disco haud profundis, stria suturali ad apicem impressa. Long. 2¹/₂ mill.

Oblong, allongé, presque parallèle, convexe, marron peu foncé, couvert d'une pubescence flave, couchée, comprenant sur les élytres des lignes poils plus longs dessinant une ligne pubescente sur chaque intervalle des lignes ponctuées. Antennes épaisses; 2^{me} article carré, dernier subglobuleux, plus étroit que le précédent. Tête déprimée, éparsément ponctuée, obliquement striolée de chaque côté en avant vers la naissance des antennes. Prothorax environ une fois et demie aussi large que long, subparallèle, arrondi, rétréci vers les angles antérieurs; sommet et base subsinués de chaque côté; angles antérieurs presque droits, saillants en avant, postérieurs aigus, saillants obliquement en dehors; disque éparsément ponctué surtout dans le milieu, de chaque côté, vers le bord latéral une carène longitudinale limitant en dedans une dépression longitudinale concave densément ponctuée; bords latéraux finement crénelés; de chaque côté de la base, à peu près à égale distance de l'écusson et de l'angle postérieur une impression triangulaire. Elytres environ deux fois aussi longs que larges ensemble, finement ponctués en lignes; points de la région discoïdale moins marqués; intervalles des lignes larges; strie suturale enfoncée vers le sommet.

République Argentine (Buenos Ayres).

Je rapporte à la même espèce un exemplaire provenant de la Province de Tucuman remarquable par sa ponctuation générale beaucoup plus accentuée que chez les exemplaires de la Province de Buenos Ayres.

Le *D. consobrinus* doit se ranger dans le sous genre *Marginus* Lec.

Hapalips brevis n. sp.

Oblongo-elongatus, modice convexus, nitidulus, sat dense flavo-pubesceus, rufo-castaneus; antennis sat incrassatis, articulis 4-8 transversis; capite profunde et haud dense punctato, antice utrinque impresso; prothorace transverso, antice posticeque angustato, sat dense fortiterque punctato, lateribus leviter acuatis, ante basin breviter subsinuatis, basi marginato, utrinque sinuato; elytris basin versus haud latioribus quam prothorace, lineato-punctatis, substriatis, striis ad apicem evanescentibus, intervallis striarum uni-lineato-punctatis, punctis intervallorum minoribus quam illis striarum, stria suturali ad apicem magis impressa et sat fortiter reducta. Long. 3½ mill.

Oblong, allongé, modérément convexe, un peu brillant, marron un peu clair, couvert d'une pubescence flave, assez longue, pas très serrée. Antennes un peu épaisses, articles 4 à 8 transversaux; articles de la massue bien séparés, 1^{er} et 2^{me} transversaux, égaux, 3^{me} subovoïde presque aussi long que large. Ponctuation de la tête profonde, peu serrée, marge antérieure avec deux impressions obliques, en forme de courtes strioles. Prothorax environ deux fois aussi large dans sa plus grande

largeur que long, également rétréci au sommet qu'à la base, arrondi sur les côtés, présentant sa plus grande largeur un peu avant la base, côtés rebordés subémarginés avant les angles postérieurs; base rebordée, sinuée de chaque côté, ponctuation plus forte que celle de la tête, assez dense; marge basilaire du prothorax impressionnée de chaque côté. Elytres subovales, sensiblement aussi larges à la base que le prothorax, moins de trois fois aussi longs que larges ensemble dans la plus grande largeur, ponctués en lignes, striés; stries et pointes effacées au sommet, strie suturale bien marquée et assez enfoncée dans la région apicale des élytres.

République Argentine (Gob. Misiones).

Hapalips piceus n. sp.

Oblongo-elongatus, convexus, nitidus, glaber, piceus, antennis pedibusque rufo-piceis; antennis subelongatis, articulis 4-8 transversis; capite profunde et sat parce punctato, antice utrinque foveolato; prothorace transverso, basin postice vix angustiore quam antice, sat parce punctato, lateribus rotundatis, marginatis obtusissime dentatis; elytris basin versus latioribus quam prothorace, punctato-striatis, striis haud profundis, ad apicem sensim evanescentibus, intervallis striarum latis, tenuiter et oparsissime unilineato-punctatis. Long. 4 $\frac{1}{2}$ mill.

Oblong, allongé, convexe, brillant, glabre, brun de poix; antennes, extrémité des élytres et pattes plus clairs. Antennes relativement grêles, articles 4 à 8 transversaux. Tête profondément et assez éparsément ponctuée, impressionnée de chaque côté vers la naissance de l'antenne. Prothorax environ une fois et un tiers plus large que long, à peine plus rétréci à la base qu'au sommet, assez éparsément ponctué; côtés arrondis, rebordés, obtusement et largement dentés. Elytres plus larges à la base que le prothorax, atténués vers le sommet environ trois fois et demie plus longs que larges dans leur plus grande largeur, ponctués, striés; stries peu profondes, s'atténuant et disparaissant vers le sommet; intervalles des stries larges, chacun avec une ligne de petits points très espacés.

République Argentine, Province de Buenos Ayres (Ensenada).

Cryptophagus germaini n. sp.

Oblongus, convexus, nitidus, fulvo-ferrugineus, fulvo-pubescens; antennis subincrassatis; capite prothoraceque dense et sat fortiter punctatis, hoc transverso, antice quam postice tam lato, subhexagono; angulis anticis rotundatis, stricte calosis, lateribus marginatis, denticulo laterali medio sito; elytris ovatis, sat instatis ad basin, haud latioribus quam prothorace, dense punctatis, punctis minoribus quam illis prothoracis. Long. 2 $\frac{1}{2}$ mill.

Oblong, convexe, brillant, fauve-ferrugineux, couvert d'une pubescence fauve simple, couchée, pas très serrée. Antennes un peu épaisses. Tête densément et fortement ponctuée; longueur des yeux inférieure à la moitié de la longueur de la tête. Prothorax environ deux fois aussi large que long, sensiblement aussi large à la base qu'au sommet, densément et fortement ponctué; bord antérieur arqué en avant, base faiblement sinuée de chaque côté, côtés subanguleux, denticule latéral situé vers le milieu; angles antérieurs arrondis étroitement caeux, callosité n'atteignant pas le quart de la longueur du côté. Elytres de même largeur à la base que le prothorax, arrondis aux épaules, légèrement ventrus, environ deux fois aussi longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur, densément ponctués; ponctuation moins forte que celle du prothorax.

Chili.

***Mycetophagus frater* n. sp.**

Oblongus, convexus, nitidulus, fulvo-pubescentis, niger prothorace, elytrisque rufo-maculatis, pedibus rufo-testaceis; stria interantennalis valde impressa, angulosa, medio per brevem striam in longitudinem continuata; prothorace transversissimo. antice quam postice angustiore. margine antico lateribusque sat striate rufo marginatis, utrinque duabus maculis punctiformibus, rufis cum margine laterali conjunctis: prima ad angulum anticum, secunda prope medium; elytris leviter punctato-striatis. striis ad apicem evanescentibus, lateribus stricte rufo-maculatis, singulo elytro rufo quinque rufo-maculato, 1^a ad basin transverso undulata, antice posticeque profunde emarginata, suturam sub attingente, 2^a et 3^a minimis, cum vitta laterali congenitis, 4^a ante apicali, suborbiculari, 5^a apicali. Long. 5 mill.

Oblong, convexe, un peu brillant, couvert d'une pubescence fauve médiocrement dense, noir, taché de roux. Antennes noires, base et extrémité du dernier article rougeâtre. Strie interantennaire profonde, anguleuse, continuée au sommet de l'angle par une courte strie longitudinale. Prothorax plus de deux fois plus large que long, plus rétréci au sommet qu'à la base; côtés arrondis, bords antérieurs et latéraux étroitement bordés de roux; de chaque côté deux taches arrondies rouges, réunies à la bordure latérale: la première à l'angle antérieur, la 2^{me} vers le milieu de la longueur. Ecusson roux, transversal, suboblong. Elytres un peu moins de deux fois aussi long; que larges ensemble, ponctués, striés; stries s'atténuant et s'effaçant vers le sommet; bords latéraux étroitement rebordés de roux; sur chaque élytre cinq taches rougeâtres: la première vers la base, allant du bord latéral jusqu'à la strie suturale, enclosant à l'épaule une petite tache noire, descendant obliquement vers la suture, très profondément échancrée à ses deux bords; les 2^{me} et 3^{me} ponctifor-

mes également soudées à la bande marginale vers le tiers basilaire et un peu au delà du milieu; la quatrième ante apicale, suborbiculaire; la cinquième formée au sommet par la dilatation de la bande marginale. Pattes roux-testacées.

République Argentine (La Plata).

Heterocerus Bruchi n. sp.

Oblongus, convexus, dense breviterque fusco-griseo-pubescens fusconiger, elytris ochraceo-variegatis; capite antice truncato; prothorace transversissimo, antice angustato, margine antico stricte et angulis anticis ochraceis, posticis haud marginatis, elytris substriatis, singulo ochraceo-multimaculato; segmentis abdominis ad latera sat late, ad apicem stricte rufo-testaceis, pedibus rufis, gennibus tibiisque plus minusve infuscatis; suturis metasternalibus haud manifestis; striis femorum posticorum apertis. Long. 4 mill.

Oblong, convexe, couvert d'une pubescence feutrée grise assombrie, entremêlée de petites soies courtes, dorées qui donnent à ensemble un aspect soyeux, noir impur olivâtre varié de taches d'un roux jaunâtre sur les élytres. Antennes rougeâtres à la base. Tête surbaissée en avant, transversalement concave entre les naissances des antennes, tronquée en avant. Prothorax plus de trois fois plus large dans sa plus grande largeur que long, rétréci en avant, arrondi sur les côtés mais subparallèle à la base; bord antérieur étroitement bordé de roux; angles antérieurs obtus rougeâtres, angles postérieurs obtus non rebordés. Elytres environ une fois et deux tiers aussi longs que larges ensemble, substriés; chacune avec huit petites taches oblongues d'un roux jaunâtre; deux discoïdales disposées sur une ligne oblique partant un peu au dessous de l'épaule, les trois suivantes placées presqu'en ligne droite dans une direction parallèle à celle des deux premières vers le milieu de la longueur, les deux suivantes également sur une ligne oblique parallèle aux deux premières, vers l'extrémité la dernière apicale presque latérale, beaucoup plus rapprochée de l'alignement du bord latéral que de la suture. Pattes rougeâtres; tibias plus ou moins enfermés.

République Argentine (La Plata).

Heterocerus validus n. sp.

Oblongus, convexus, sat latus, fuscus; pube brevi flavo-grisea haud dense vestitus; antennis basin versus rufis; capite antice sinuato, subplano; prothorace transversissimo, antice angustato, lateribus rotundatis, haud late rufo-ochraceo marginatis, angulis anticis late obtusis, basi marginata et utrinque stricte rufo-ochracea; elytris subsulcatis, singulo ad latus rufo-ochraceo marginato et in disco septem maculato:

pedibus fulvo-testaceis; suturis metasternalibus manifestis; striis femorum posticorum apertis. Long. 4 $\frac{1}{2}$ mill.

Oblong, convexe, assez large, noirâtre, couvert d'une pubescence d'un gris flave, courte et peu serrée sur les élytres, plus sombre et feutrée sur la tête et le prothorax. Base des antennes rougeâtre. Tête subdéprimée; bord antérieur sinué. Prothorax environ trois fois plus large dans sa plus grande largeur que long, fortement rétréci en avant, faiblement à la base; arrondi sur les côtés; ceux-ci assez étroitement bordés de roux jaunâtre, rebordé à la base; angles antérieurs très largement obtus, postérieurs obtus, bordés dans la branche basilaire par une fine bordure jaunâtre. Elytres environ une fois et demie aussi longs que larges ensemble, subsillonées; bordées sur les côtés par une bande jaunâtre se dilatant dans la partie apicale et s'étendant jusqu'au sommet; sur le disque sept taches jaunâtres: la 1^{re} scutellaire s'allongeant parallèlement à la suture et se dilatant contre la base; les trois suivantes formant une bande anguleuse vers le 1^{er} tiers à partir de la base, réunie extérieurement à la bordure marginale, les deux suivantes dessinant une bande arquée, au delà du milieu, n'atteignant pas la bordure marginale qui se trouve elle-même dilatée: en face de la tache externe, la dernière sur la partie déclive de l'élytre, en forme de h renversé. Pattes roux testacé, segments abdominaux largement bordés de roux jaunâtre sur les côtés. Sutures métasternales marquées. Stries des fémurs postérieurs ouvertes.

République Argentine (Province Buenos Ayres).

Heteroceris Bergi n. sp.

Oblongus, convexus, nitidulus, pube grisea, brevissima et haud dense vestitus, rufo-testaceus; elytris testaceis, in disco plus minusve infuscatis, pedibus testaceis; capite transversissimo, antice truncato: prothorace transversissimo, densissime punctulato, lateribus subparallelis, juxta angulos anticos intus arcuatis et dein abrupte parallelis reflexis angulis posticis subrotundatis, basi utrinque marginata; elytris dense punctatis; suturis metasternalibus haud manifestis; striis coxarum posticarum apertis. Long. 2 $\frac{1}{8}$ mill.

Oblong, convexe, un peu brillant, couvert d'une très courte pubescence grise, ne masquant pas la couleur du prothorax et des élytres, roux; élytres testacés plus ou moins enfermés sur le disque; pattes testacées. Tête très large, tronquée en avant, feutrée. Prothorax plus de deux fois plus large que long, très densément pointillé; côtés subparallèles, fortement arrondis en dedans près des angles antérieurs, presque redressé à ces angles; marge antérieure transversalement subsillonée de chaque côté; base rebordée de chaque côté. Elytres environ une fois et

demie aussi longs que larges ensemble densément et beaucoup plus fortement ponctués que le prothorax. Sutures métathoraciques non marquées. Plaque fémorale des hanches postérieures fermée.

République Argentine (Province Buenos Ayres).

Je rapporte à la même espèce un exemplaire provenant de la Province de Tucuman, présentant une coloration plus rougeâtre et une vague tache claire au milieu de la zone foncée du disque des élytres.

Heterocerus quadraticollis n. sp.

Oblongus, molice convexus, pube grisea brevissimaque sat dense vestitus, fulvo-testaceus; singulo elytro in longitudinem piceo maculato, macula ad basin dilatata, regionem scutellarem tenente et ad apicem ex-tus curvata et retrorsum producta. Capite antice sinuato; prothorace transversissimo, subopaco, densissime punctulato, lateribus subparalle-lis, antice valde rotundatis et prope angulos anticos abrupte parallelo-reflexis, angulis anticis vix rectis, posticis obtusissimis fere hebetatis, margine antico utrinque subsulcato, basi utrinque oblique truncata et marginata, elytris sat parce punctulatis, punctis majoribus quam illis prothoracis; pedibus testaceis, suturis metasternalibus haud manifestis: striis coxarum posticarum apertis. Long. 2 mill

Oblong, modérément convexe, couvert d'une pubescence grise, très courte, ne masquant pas la couleur du tégument, testacé légèrement rougeâtre sur la tête et le prothorax; sur chaque élytre une bande longitudinale brun de poix envahissant la région scutellaire, se dilatant vers l'extrémité et se terminant par une branche recourbée en arrière, en forme de croc. Tête un peu rembrunie, déprimée, sinuée en avant. Prothorax environ deux fois et un tiers plus large dans sa plus grande largeur que long; peu brillant, très densément pointillé; côtés subparallèles arqués en dedans près des angles antérieurs; puis brusquement redressés pour former des angles antérieurs presque droits; angles postérieure très largement obtus, presque émoussés; marge antérieure subsillonués de chaque côté; base obliquement tronquée de chaque côté, non rebordée. Elytres environ une fois et demie aussi longs que larges ensemble, un peu brillants, assez éparsément pointillés; ponctuation plus forte que celle du prothorax. Sutures métathoraciques non marquées. Plaques des hanches postérieures ouvertes.

République Argentine (Province de Tucuman).