

DESCRIPTION

DE DEUX

COLÉOPTÈRES DE L'AMÉRIQUE MÉRIDIONALE

PAR MAURICE PIC

Dromanthus lateralis

Subparallelus, nitidus, griseo pubescens, niger, thorace pro majore parte femoribusque basi rufo testaceis; elytris nigro caerulescentibus, ad medium et lateraliter testaceo limbatis.

Subparallèle, peu large, brillant, assez densément pubescent de gris avec quelques poils dressés, en partie noir, en partie testacé-rougeâtre. Tête peu ponctuée, biimpressionnée entre les yeux, noire avec les parties buccales rousses; antennes courtes, s'épaississant graduellement avec le dernier article plus long que le précédent, noires avec le dessous des premiers articles roussâtres; prothorax court et large, presque lisse, testacé-roussâtre avec une large macule discale foncée antérieure, un peu explané postérieurement et en arrière; écusson large, foncé; élytres densément et ruguleusement ponctués, un peu plus large que le prothorax, presque parallèles, courtement atténués au sommet, explanés et rebordés au milieu, d'un noir à reflets bleutés et ornés sur leur milieu latéral d'une bordure testacée étroite qui s'oblitère en avant et en arrière; pattes foncées avec la base des cuisses plus ou moins testacé-roussâtre. Longueur 4 millimètres environ, Brésil. Communiqué par monsieur C. Bruch.

Voisin de *D. discoideus* Gorh., mais coloration du prothorax plus largement testacée, antennes de structure différente et élytres un peu brillants.

Hadrobregmus incisicollis

Elongatus, satis angustatus, luteo-pubescens, fere opacus, nigro piceus, antennis pedibusque brunnescentibus.

Allongé, assez étroit, presque mat, pubescent de jaune et hérissé de quelques longs poils dressés, noir de poix avec les antennes et les pattes brunâtres. Tête petite, ruguleuse, yeux noirs; antennes d'un brun clair, peu épaisses, avec les derniers articles allongés; prothorax densément et granuleusement ponctué, long, fortement sinué sur les cotés avec une large dent émoussée près de la base et légèrement échancré au milieu du bord antérieur, relevé plus ou moins en bourrelet sur tout son pourtour, sillonné sur le milieu du disque qui, en outre, présente une courte gibbosité postérieure non anguleuse; écusson grand, pubescent de fauve; élytres de la largeur du prothorax, assez longs, subparallèles, courtement atténués à l'extrémité, subtronqué sur leur sommet médian, à stries bien marquées, ponctuées de points larges, presque carrés, interstriés étroits avec quelques petites granulations; pattes assez robustes, brunâtres; dessous du corps foncé, pubescent, un peu granuleux, derniers segments de l'abdomen impressionnés au milieu. Longueur 10 millimètres. République Argentine : Río Negro (C. Bruch).

Cette nouveauté, distincte entre toutes par la structure de son prothorax muni d'une incision au bord antérieur, peut se placer près de *punctatipennis* Pic; *incisicollis* est plus grand et plus large, non brillant, plus largement strié-ponctué sur les élytres, enfin le prothorax a sa gibbosité discale un peu plus élevée, le pourtour plus relevé et une échancrure au bord antérieur.

Digoin (Sàone-et-Loire).