

Contribución al conocimiento de las aves presentes en la costa rioplatense de los partidos de Quilmes y Avellaneda (Buenos Aires, Argentina)

E.S. Montalibet¹, M.A. Sosa¹, S. Rozadilla^{1,2}, N. Lazarte¹ y F.M. Irazoqui¹

¹Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Avenida 122 y 60 (1900) La Plata, Buenos Aires, Argentina. E-mails: estrella.montalibet@gmail.com; alesosa_15@hotmail.com; nicolaslazarte07@gmail.com; facundopaleo@hotmail.com

²Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados, Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", Av. Ángel Gallardo 470, C1405DJR Buenos Aires, Argentina. E-mail: sebastianrozadilla@gmail.com

RESUMEN. En este trabajo se presentan nuevos registros de aves para la costa rioplatense de los partidos de Quilmes y Avellaneda (Provincia de Buenos Aires, Argentina). La zona estudiada incluye dos áreas protegidas: Reserva Natural Municipal Los Sauces y el Parque Natural y Reserva Ecológica Municipal Selva Marginal Quilmeña, como también sectores sin categoría de conservación, abarcando en conjunto más de 300 hectáreas. Las observaciones se realizaron tanto por el Club de Observadores de Aves de Bernal como por estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (Universidad Nacional de la Plata). Se adiciona un total de 31 especies nuevas en relación a trabajos anteriores, pertenecientes a las familias Tinamidae (1), Falconidae (1), Anatidae (2), Ardeidae (1), Rallidae (3), Strigidae (2), Cuculidae (1), Alcedinidae (1), Furnariidae (7), Sturnidae (1), Motacillidae (1), Thraupidae (2), Tityridae (1), Tyrannidae (5), Icteridae (2). Destacan los registros de *Spartonoica maluroides* (Espartillero enano) y *Asthenes hudsoni* (Espartillero pampeano), ambas catalogadas como vulnerables, además de varias especies categorizadas como escasas y sensibles frente a disturbios antropogénicos. También se ha observado un ejemplar de *Icterus croconotus* (Matico), una especie natural de la ecorregión del Chaco Húmedo. Cabe señalar el registro de *Acridotheres cristatellus* (Estornino crestado), ave introducida en nuestro país, cuyo impacto en las especies nativas tanto de aves como de otros animales es desconocido. Con esta contribución, se adicionan registros con valor conservacionista y el número de especies observables pasa de 124 a 155 para éste área, que se encuentra bajo un importante impacto antrópico y es considerado un posible corredor biológico entre las reservas Costanera Sur y Punta Lara.

Palabras clave: *Región rioplatense, corredor biótico, biodiversidad, Aves, Áreas Protegidas.*

ABSTRACT. Contribution to the knowledge of the birds of Quilmes and Avellaneda (Buenos Aires, Argentina). On this paper new bird registers are provided on the Quilmes and Avellaneda (Buenos Aires province, Argentina) district's river coast. The studied region includes two preserved areas: Municipal Natural Reserve Los Sauces and Natural Park and Municipal Ecologic Reserve Selva

Marginal Quilmeña, as well as uncategorized conservation sectors, covering, as a whole, more than 300 hectares. Observations were made by the Bernal's Bird Observers Club, as well as by students from Facultad de Ciencias Naturales y Museo (Universidad Nacional de La Plata). 31 new species were added in comparison to old papers, belonging to the families Tinamidae (1), Falconidae (1), Anatidae (2), Ardeidae (1), Rallidae (3), Strigidae (2), Cuculidae (1), Alcedinidae (1), Furnariidae (7), Sturnidae (1), Motacillidae (1), Thraupidae (2), Tityridae (5), Icteridae (2). Registers on *Spartonoica maluroides* (Bay-capped Wren-spinetail) and *Asthenes hudsoni* (Hudson's Canastero) stand out, both of them labeled as vulnerable, besides several other species classified as scarce and sensitive to anthropogenic disturbances. A single specimen of *Icterus croconotus* (Orange-backed Troupial), a native species from Chaco Húmedo (Wet Chaco) ecoregion, was spotted too. It is noteworthy to point out the recording of *Acridotheres cristatellus* (Crested Myna), a bird that was introduced in our country and whose impact on native birds and other animal species is unknown. With this contribution, registers with conservationist value were added, and the number of observable species rises from 124 to 155 for this area, which is under an important antropic impact, and it is considered a possible ecological corridor between Punta Lara and Costanera Sur natural reserves.

Key words: *Río de la Plata region, biotic corridor, biodiversity, birds, Protected Areas.*

Introducción

Los relevamientos de aves son importantes ya que aportan datos significativos para adoptar medidas en cuanto a la conservación de los ambientes (Alonso *et al.* 2008; Chebez *et al.* 1998). Es indispensable saber cuántas aves y en qué abundancia están presentes en un área determinada, para investigar sobre su reproducción, distribución, ecología, entre otros aspectos. También son fundamentales los estudios a largo plazo para entender las variaciones de la diversidad de la avifauna en el tiempo y la influencia que las actividades antrópicas puedan tener sobre ella (Blanco & Canevari 1993).

En este sentido es que se ha buscado tener un registro completo de la avifauna presente en la costa rioplatense de los partidos de Quilmes y Avellaneda. En estos sitios se encuentran la Reserva Municipal Los Sauces y el Parque Natural y Reserva Ecológica Municipal Selva Marginal Quilmeña, así como también sectores sin categoría de conservación. Para esta área se cuenta con estudios previos recientes sobre avifauna (Godoy *et al.* 2012) y este trabajo pretende complementar dicho relevamiento, adicionando registros novedosos de aves a las 124 registradas por estos autores. Se busca además, que los resultados aquí expuestos funcionen como una herramienta para la conservación de las zonas estudiadas.

Materiales y métodos

El área estudiada se encuentra en los partidos de Avellaneda y Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina, siendo un polígono delimitado por la Autopista Buenos Aires - La Plata y el Canal Santo Domingo (Villa Domínico, partido de Avellaneda) (34°40'52.88"S, 58°18'55.90"O), la desembocadura del Canal Santo Domingo en el Río de La Plata (34°40'5.02"S, 58°17'59.20"O), la desembocadura de un arroyo de la localidad de Quilmes en el Río de La Plata (34°41'44.72"S, 58°14'48.20"O) y dicho arroyo y la Autopista Buenos Aires - La Plata (34°42'19.95"S, 58°15'51.69"O). Este sector corresponde a la Región Neotropical, Dominio Chaqueño, Provincia Pampeana, Distrito Pampeano Oriental (Cabrera & Willink 1973). Los ambientes costeros del partido de Quilmes han sido declarados Reserva Municipal bajo las ordenanzas municipales N° 8255/96

(Reserva Natural Municipal Los Sauces) y la N° 9348/02 y su modificatoria, ordenanza N°9508/03 (Parque Natural y Reserva Ecológica Municipal Selva Marginal Quilmeña).

La superficie muestreada posee una extensión de más de 300 hectáreas e incluye una multiplicidad de ambientes: costa, juncal costero, bosque ribereño, eucaliptal, talaes, pastizal, pastizal inundable y varios cuerpos de agua que incluyen arroyos, bañados y lagunas (Godoy *et al.* 2012; Guerrero *et al.* 2012). En relación a los disturbios antropogénicos se presentan pequeños basurales, proximidad de grandes ciudades al otro lado de la Autopista Buenos Aires-La Plata y pequeños asentamientos hacia el final de la calle Espora (avenida que conecta la ciudad de Bernal con el Río de La Plata) en la costa de Bernal (partido de Quilmes), situaciones de caza y pesca furtiva y fábricas en las cercanías que amenazan la salud de los cuerpos de agua. En cuanto a su relevancia biogeográfica, el sitio constituye el límite austral de distribución de varias especies y es hábitat de animales y plantas poco frecuentes en la región, así como de taxones amenazados por cambios ambientales, todos ellos de filiación paranaense (Guerrero *et al.* 2012). Además, tiene gran valor como zona de conectividad en la ruta de dispersión biótica Paraná-Uruguay-Plata (Guerrero *et al.* 2012).

Los relevamientos se realizaron durante sucesivas salidas al campo, comenzando en julio de 2013 y finalizando en enero de 2016, a través de visitas periódicas con un promedio de una visita por mes. Se relevaron los distintos ambientes presentes en el área de estudio, recorriendo senderos, calles, márgenes de arroyos, bañados y lagunas, y las playas de la zona costera. Durante cada jornada de muestreo se recorrieron aproximadamente 5 kilómetros. La avifauna fue muestreada a través de observación directa, utilizando binoculares y mediante registros de canto, por la mañana entre las 8:00 y las 13:00 horas y por la tarde entre las 16:00 y las 20:00 horas. Las tareas se realizaron en conjunto entre alumnos de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata (FCNyM, UNLP) y el Club de Observadores de Aves de Bernal (COA Bernal).

Se presenta un listado de las especies muestreadas comentando aquellas que poseen valor conservacionista. Para el mismo se siguió el ordenamiento sistemático de Remsen *et al.* 2016, y se proporcionan los nombres vulgares sugeridos para la Argentina (Navas *et al.* 1991). Para la identificación de las especies se utilizó guía de campo (Narosky e Yzurieta 2010).

Resultados

Se contabilizan un total de 155 especies de aves para la zona estudiada (Tabla 1), de las cuales 31 son nuevos registros en el área de estudio (Figura 1) teniendo como referencia el trabajo de Godoy *et al.* (2012). Tres de los 31 nuevos registros corresponden a especies catalogadas como Vulnerables: *Spartonoica maluroides* (Espartillero enano), *Asthenes hudsoni* (Espartillero pampeano) e *Icterus croconotus* (Matico). Este último, propio de la región chaqueña de Argentina, probablemente represente un ejemplar proveniente de cautiverio, ya que solo observamos un único individuo. Además, se observó una especie introducida: *Acridotheres cristatellus* (Estornino crestado).

Tabla 1: Lista de aves observadas en la Reserva Municipal Los Sauces y el Parque Natural y Reserva Ecológica Municipal Selva Marginal Quilmeña (partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires) y los ambientes costeros del partido de Avellaneda (provincia de Buenos Aires). Se destacan en negrita los 31 nuevos registros para el área aportados por esta contribución.

Orden y Familia	Especie	Nombre común	Estatus
Tinamiformes			
Tinamidae	<i>Nothura maculosa</i>	Inambú Común	NA
Anseriformes			
Anhimidae	<i>Chauna torquata</i>	Chajá	NA
Anatidae	<i>Dendrocygna viduata</i>	Pato sirirí pampa	NA

	<i>Heteronetta atricapilla</i>	Pato cabeza negra	NA
	<i>Coscoroba coscoroba</i>	Coscoroba	NA
	<i>Cygnus melancoryphus</i>	Cisne cuello negro	NA
	<i>Anas sibilatrix</i>	Pato overo	NA
	<i>Anas flavirostris</i>	Pato barcino	NA
	<i>Anas cyanoptera</i>	Pato colorado	NA
	<i>Anas georgica</i>	Pato maicero	NA
	<i>Anas platalea</i>	Pato cuchara	NA
	<i>Anas versicolor</i>	Pato capuchino	NA
	<i>Netta peposaca</i>	Pato picazo	NA
	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	Pato cutirí	NA
	<i>Oxyura vittata</i>	Pato zambullidor chico	NA
Podicipediformes			
Podicipedidae	<i>Rollandia rolland</i>	Macá común	NA
	<i>Podilymbus podiceps</i>	Macá pico grueso	NA
	<i>Podiceps major</i>	Macá grande	NA
Ciconiiformes			
Ciconiidae	<i>Ciconia maguari</i>	Cigüeña americana	NA
Suliformes			
Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Biguá	NA
Pelecaniformes			
Ardeidae	<i>Butorides striata</i>	Garcita azulada	NA
	<i>Tigrisoma lineatum</i>	Hocó colorado	NA
	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Garza bruja	NA
	<i>Ardea cocoi</i>	Garza mora	NA
	<i>Ardea alba</i>	Garza blanca	NA
	<i>Egretta thula</i>	Garcita blanca	NA
	<i>Syrigma sibilatrix</i>	Chiflón	NA
Threskiornithidae	<i>Plegadis chihi</i>	Cuervillo de cañada	NA
	<i>Phimosus infuscatus</i>	Cuervillo cara pelada	NA
	<i>Platalea ajaja</i>	Espátula rosada	NA
Accipitriformes			
Accipitridae	<i>Elanus leucurus</i>	Milano blanco	NA
	<i>Rupornis magnirostris</i>	Taguató común	NA
	<i>Parabuteo unicinctus</i>	Gavilán mixto	NA
Gruiformes			
Rallidae	<i>Gallinula galeata</i>	Pollona negra	NA
	<i>Porphyriops melanops</i>	Pollona pintada	NA
	<i>Laterallus melanophaius</i>	Burrito común	NA
	<i>Aramidea ypecaha</i>	Ipacaá	NA
	<i>Aramides cajaneus</i>	Chiricote	NA
	<i>Fulica armillata</i>	Gallareta ligas rojas	NA
	<i>Fulica leucoptera</i>	Gallareta chica	NA
	<i>Fulica rufifrons</i>	Gallareta escudete rojo	NA
Aramidae	<i>Aramus guarauna</i>	Carau	NA

Charadriiformes			
Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	Tero común	NA
Recurvirostridae	<i>Himantopus mexicanus</i>	Tero real	NA
Scolopacidae	<i>Tringa melanoleuca</i>	Pitotoy grande	NA
	<i>Gallinago paraguaiiae</i>	Becasina común	NA
Jacaniidae	<i>Jacana jacana</i>	Jacana	NA
Rostratulidae	<i>Nycticryphes semicollaris</i>	Aguatero	NA
Laridae	<i>Larus dominicanus</i>	Gaviota cocinera	NA
	<i>Chroicocephalus maculipennis</i>	Gaviota capucho café	NA
Rynchopidae	<i>Rynchops niger</i>	Rayador	NA
Columbiformes			
Columbidae	<i>Columbina picui</i>	Torcacita	NA
	<i>Columba livia</i>	Paloma doméstica	I
	<i>Patagioenas picazuro</i>	Picazuró	NA
	<i>Zenaida auriculata</i>	Torcaza	NA
	<i>Leptotila verreauxi</i>	Yerutí común	NA
Psittaciformes			
Psittaciformes	<i>Myiopsitta monachus</i>	Cotorra	NA
Cuculiformes			
Cuculidae	<i>Coccyzus melacoryphus</i>	Cuclillo canela	NA
	<i>Guira guira</i>	Pirincho	NA
Strigiformes			
Strigidae	<i>Athene cunicularia</i>	Lechucita vizcachera	NA
	<i>Pseudoscops clamator</i>	Lechuzón orejudo	NA
	<i>Asio flammeus</i>	Lechuzón de campo	NA
Trochiliformes			
Trochilidae	<i>Chlorostilbon lucidus</i>	Picaflor común	NA
	<i>Leucochloris albicollis</i>	Picaflor garganta blanca	NA
	<i>Hylocharis chrysura</i>	Picaflor bronceado	NA
Coraciiformes			
Alcedinidae	<i>Chloroceryle amazona</i>	Martín pescador mediano	NA
	<i>Chloroceryle americana</i>	Martín pescador chico	NA
	<i>Megaceryle torquata</i>	Martín pescador grande	NA
Piciformes			
Picidae	<i>Colaptes campestris</i>	Carpintero campestre	NA
	<i>Colaptes melanochloros</i>	Carpintero real	NA
	<i>Veniliornis mixtus</i>	Carpintero bataraz chico	NA
Falconiformes			
Falconidae	<i>Falco femoralis</i>	Halcón plomizo	NA
	<i>Falco sparverius</i>	Halconcito colorado	NA
	<i>Caracara plancus</i>	Carancho	NA
	<i>Milvago chimango</i>	Chimango	NA
Passeriformes			
Furnariidae	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	Curutié Colorado	NA
	<i>Anumbius annumbi</i>	Leñatero	NA

	<i>Synallaxis albescens</i>	Pijúi cola parda	NA
	<i>Synallaxis spixi</i>	Pijúi plumizo	NA
	<i>Synallaxis frontalis</i>	Pijúi frente gris	NA
	<i>Phacellodomus striaticollis</i>	Espinero pecho manchado	NA
	<i>Asthenes hudsoni</i>	Espartillero pampeano	V
	<i>Spartonoica maluroides</i>	Espartillero enano	V
	<i>Leptasthenura platensis</i>	Coludito copetón	NA
	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	Chincherito chico	NA
	<i>Cinclodes fuscus</i>	Remolinera común	NA
	<i>Furnarius rufus</i>	Hornero	NA
	<i>Cranioleuca sulphurifera</i>	Curutié ocráceo	NA
	<i>Phleocryptes melanops</i>	Junquero	NA
Tyrannidae	<i>Serpophaga griseicapilla</i>	Piojito trinador	NA
	<i>Phylloscartes ventralis</i>	Mosqueta común	NA
	<i>Myiophobus fasciatus</i>	Mosqueta estriada	NA
	<i>Xolmis cinereus</i>	Monjita gris	NA
	<i>Xolmis coronatus</i>	Monjita coronada	NA
	<i>Xolmis irupero</i>	Monjita blanca	NA
	<i>Hymenops perspicillatus</i>	Pico de plata	NA
	<i>Tyrannus savana</i>	Tijereta	NA
	<i>Tyrannus melancholicus</i>	Suirirí real	NA
	<i>Machetornis rixosa</i>	Picabuey	NA
	<i>Pitangus sulphuratus</i>	Benteveo	NA
	<i>Myiodynastes maculatus</i>	Benteveo rayado	NA
	<i>Satrapa icterophrys</i>	Suirirí amarillo	NA
	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	Churrinche	NA
	<i>Elaenia parvirostris</i>	Fío fío pico corto	NA
	<i>Pseudocolopteryx flaviventris</i>	Doradito común	NA
	<i>Serpophaga nigricans</i>	Piojito gris	NA
	<i>Serpophaga subcristata</i>	Piojito común	NA
Cotingidae	<i>Phytotoma rutila</i>	Cortarramas	NA
Tityridae	<i>Pachyrhamphus polychopterus</i>	Anambé común	NA
Vireonidae	<i>Vireo olivaceus</i>	Chiví común	NA
	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	Juan chiviro	NA
Hirundinidae	<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	Golondrina ceja blanca	NA
	<i>Tachycineta meyeni</i>	Golondrina patagónica	NA
	<i>Progne chalybea</i>	Golondrina doméstica	NA
	<i>Progne tapera</i>	Golondrina parda	NA
	<i>Hirundo rustica</i>	Golondrina tijerita	NA
Troglodytidae	<i>Troglodytes aedon</i>	Ratona común	NA
Poliptilidae	<i>Poliptila dumicola</i>	Tacuarita azul	NA
Turdidae	<i>Turdus amaurochalinus</i>	Zorzal chalchalero	NA
	<i>Turdus rufiventris</i>	Zorzal colorado	NA
Mimidae	<i>Mimus triurus</i>	Calandria real	NA
	<i>Mimus saturninus</i>	Calandria grande	NA

Sturnidae	<i>Acridotheres cristatellus</i>	Estornino crestado	I
	<i>Sturnus vulgaris</i>	Estornino pinto	I
Motacillidae	<i>Anthus correndera</i>	Cachirla común	NA
Thraupidae	<i>Donacospiza albifrons</i>	Cachilo canela	NA
	<i>Thraupis sayaca</i>	Celestino común	NA
	<i>Paroaria coronata</i>	Cardenal común	NA
	<i>Paroaria capitata</i>	Cardenilla	NA
	<i>Sporophila collaris</i>	Corbatita dominó	NA
	<i>Sporophila caeruleascens</i>	Corbatita común	NA
	<i>Sicalis flaveola</i>	Jilguero dorado	NA
	<i>Sicalis luteola</i>	Misto	NA
	<i>Poospiza nigrorufa</i>	Sietevestidos	NA
	<i>Poospiza melanoleuca</i>	Monterita cabeza negra	NA
Emberizidae	<i>Zonotrichia capensis</i>	Chingolo	NA
Cardinalidae	<i>Pheucticus aureoventris</i>	Rey del bosque	NA
Parulidae	<i>Basileuterus culicivorus</i>	Arañero coronado chico	NA
	<i>Myiothlypis leucoblephara</i>	Arañero silbón	NA
	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	Arañero cara negra	NA
	<i>Setophaga pitiauyumi</i>	Pitiayumí	NA
Icteridae	<i>Icterus croconotus</i>	Matico	V
	<i>Icterus cayanensis</i>	Boyerito	NA
	<i>Molothrus rufoaxillaris</i>	Tordo pico corto	NA
	<i>Molothrus bonariensis</i>	Tordo renegrado	NA
	<i>Cacicus solitarius</i>	Boyero negro	NA
	<i>Agelasticus thilius</i>	Varillero ala amarilla	NA
	<i>Agelaioides badius</i>	Tordo músico	NA
	<i>Sturnella superciliaris</i>	Pecho colorado	NA
	<i>Pseudoleistes virescens</i>	Pecho amarillo común	NA
Fringillidae	<i>Spinus magellanicus</i>	Cabecitanegra común	NA
	<i>Carduelis chloris</i>	Verderón	I
Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	Gorrión	I
Incertae sedis	<i>Saltator aurantiirostris</i>	Pepitero de collar	NA
	<i>Saltator coerulescens</i>	Pepitero gris	NA

Referencias: NA = No Amenazado, V = Vulnerable, I = Introducido.

Discusión

En este trabajo se complementa el relevamiento de aves realizado por Godoy *et al.* (2012) en la Reserva Municipal Los Sauces, el Parque Natural y Reserva Ecológica Municipal Selva Marginal Quilmeña y los ambientes costeros del partido de Avellaneda, adicionando registros novedosos de aves a las 124 registradas por estos autores anteriormente. Se presentan 15 familias de aves pertenecientes a 9 órdenes y se adicionan 31 nuevas especies para el área. Dichos registros elevan el número de especies posibles de observar a 155. La provincia de Buenos Aires posee una variada diversidad de aves, representada por aproximadamente 400 especies (Narosky & Di Giacomo 1993), de modo que gran parte de esa diversidad (38%) ha sido observada en el área estudiada.

Se reportan algunas especies que han sido caracterizadas como escasas para el área de estudio (*Serpophaga griseicapilla*, Bodrati 2006; *Xolmis cinereus*, López-Lanús *et al.* 2008) y otras que son consideradas sensibles a los procesos antrópicos de modificación, reemplazo y contaminación del hábitat (*Falco femoralis*, *Heteronetta atricapilla*, *Porphyriops melanops*, *Certhiaxis cinnamomeus*, *Phacellodomus striaticollis*, *Leptasthenura platensis*, *Phylloscartes ventralis* y *Xolmis coronatus*; López-Lanús *et al.* 2008). Por otro lado, *Asthenes hudsoni* y *Spartonoica maluroides* presentan importancia en términos de conservación, ya que han sido catalogadas como vulnerables a nivel nacional (López-Lanús *et al.* 2008), encontrándose en menos del 1% del territorio continental y en menos del 10% del territorio nacional. Presentan además, una baja amplitud de uso de hábitat, quedando restringidas en sus sitios de residencia a los ambientes de juncal y pajonal. Se reporta también la presencia de *Acridotheres cristatellus*, especie exótica cuyos primeros registros para la Argentina datan de 1982 para la Reserva de Punta Lara (Moschione 1989). El registro de *Icterus croconotus* no es habitual para esta área de estudio, ya que es nativo de la ecorregión del Chaco Húmedo y nuestro registro probablemente se trate de un ejemplar proveniente de cautiverio. Sin embargo, Rimoldi & Pugnali (2012, 2013) registraron recientemente una pequeña población en la Reserva Ecológica Costanera Sur, lo que hace pensar que esta especie podría estar prosperando en la ecorregión pampeana.



Figura 1. Algunas de las nuevas especies de aves citadas para la zona: A. *Falco femoralis*; B. *Dendrocygna viduata*; C. *Gallinula melanops*; D. *Athene cunicularia*; E. *Pseudoscops clamator*; F. *Chloroceryle amazona*; G. *Certhiaxis cinnamomeus*; H. *Anumbius anumbi*; I. *Synallaxis albescens*; J. *Phacellodomus striaticollis*; K. *Asthenes hudsoni*; L. *Spartonoica maluroides*; M. *Acridotheres cristatellus*; N. *Anthus correndera*; Ñ. *Donacospiza albifrons*; O. *Pachyrhamphus polychropterus*; P. *Xolmis cinereus*; Q. *Icterus croconotus*; R. *Molothrus rufoaxillaris*.

Tras la reciente publicación del inventario de aves de la zona costera rioplatense de los partidos de Quilmes y Avellaneda realizado por Godoy *et al.* (2012), las posteriores visitas al área han dado cuenta de un aumento considerable en el número de especie posibles de observar, entre las que se encuentran algunas con relevancia a nivel conservacionista. Siendo el área de estudio muy cercana a los grandes centros urbanos, el impacto antrópico que esto genera en el ecosistema es muy importante y puede amenazar la diversidad biológica local. Teniendo en cuenta que los bosques ribereños que la

componen se consideran parte de la ruta de dispersión biótica Paraná-Uruguay-Plata (Guerrero *et al.* 2012), es relevante la aparición de elementos faunísticos novedosos reportados en este estudio. A modo de conclusión, creemos que contar con datos actualizados de la composición de la avifauna costera rioplatense permite conocer las variaciones cualitativas y cuantitativas en las aves de la zona, a fin de evaluar el impacto antrópico y las consecuencias en el ecosistema. De esta manera, aportamos valiosa información para la toma de decisiones en relación a la conservación de los ambientes involucrados, además de aportar al conocimiento de la dinámica de la zona como ruta de dispersión.

Agradecimientos

A Mariana Benedictto, Leonel Barral y Natalia Bogado por los aportes en el campo; a Daniel Daglio, Daniela Zaffignani y Martín Colombo por las fotografías cedidas; a Ariel Unamuno, Esteban Niedojadlo y María Florencia Sosa por las traducciones; y a Carolina Acosta Hospitaleche, Federico Agnolin y Diego Isaldo por la revisión de los escritos.

Bibliografía

- Alonso, J. 2008. *Inventario de las Aves del Parque Nacional Pre-Delta*. Administración de Parques Nacionales. Buenos Aires, Argentina. 96 pp.
- Blanco D.E. & Canevari, P. 1993. *Censo Neotropical de Aves Acuáticas 1992*. Humedales para las Americas (WA) Buenos Aires, Argentina.
- Bodrati, A., Mérida, E., Bodrati, G. & Sierra, E. 2006. Avifauna del talar de Vuelta de Obligado y de sus ambientes contiguos. San Pedro, provincia de Buenos Aires. En: Mérida, E. y J. Athor (eds.). *Talares bonaerenses y su conservación*, pp 117-124. Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Buenos Aires.
- Cabrera, A.L. & Willink, A. 1973. *Biogeografía de América Latina. Serie de Biología*. Programa Regional Desarrollo Científico y Tecnológico O.E.A., Washington, Monografía 13, 120 pp.
- Chebez, J.C., Rey, N., Babarskas, M. & Di Giacomo, A. 1998. *Las Aves de los Parques Nacionales de la Argentina. Monografía Especial L.O.L.A., N° 12*, Administración de Parques Nacionales y Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, 127 pp.
- Godoy, I., Suazo Lara, F., Guerrero, E., Rivero, P., Gonzalez, B., Alegre, M., Godoy, A., Kain, C., Sesto, F. & Chimento N.R. 2012. Relevamiento biótico de la costa rioplatense de los partidos de Quilmes y Avellaneda (Buenos Aires, Argentina). Parte II: Aves. *Historia Natural, Tercera Serie*, 2(2): 57-94.
- Guerrero, E.L., Suazo Lara, F., Chimento, N.R., Buet Constantino, F. & Simon, P. 2012. Relevamiento biótico de la costa rioplatense de los partidos de Quilmes y Avellaneda (Buenos Aires, Argentina). Parte I: Opiliones (Arachnida), Mygalomorphae (Arachnida), Chilopoda (Miriapoda) y aspectos ambientales destacables. *Historia Natural, Tercera Serie* 2(2): 31-56.
- López-Lanús, B., Grilli, P., Di Giacomo, A.S., Coconier, E.E. & Banchs, R. 2008. Categorización de las aves de la Argentina según su estado de conservación. *Informe de Aves Argentinas/AOP y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación*. Buenos Aires, Argentina. 64 pp.
- Moschione, F. 1989. Nuevas aves para la Reserva de Punta Lara. *Garganchillo* 10: 11-12.
- Narosky, T. & Di Giacomo, A.G. 1993. *Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus*. Asociación Ornitológica del Plata. Vázquez Mazini Editores. LOLA. Buenos Aires, Argentina. 127 pp.

- Narosky, T. e Yzurieta, D. 2010. *Guía para la Identificación de las Aves de Argentina y Uruguay*. Edición total. 16a edición. Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, Argentina. 432 pp.
- Navas, J.R., Narosky, T., Bó, N.A. & Chebez, J.C. 1991. *Lista Patrón de los Nombres Comunes de las Aves Argentinas*. Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires, Argentina. 32 pp.
- Rensen, J.V., Jr., Areta, J.I., Cadena, C.D., Jaramillo, A., Nores, M., Pacheco, J.F., Pérez-Emán, J., Robbins, M. B., Stiles, F. G., Stotz, D. F., & Zimmer, K. J. Version [2016]. A classification of the bird species of South. American Ornithologists' Union. En Línea: <http://www.museum.lsu.edu/~Rensen/SACCBaseline.htm>.
- Rimoldi, C. & Pugnali, G. 2012. Lista de campo de la Reserva Costanera Sur. Aves registradas 2011/2012. [Fecha de consulta: Septiembre 2015]. Disponible en: <http://www.reservacostanera.com.ar/wp-content/uploads/2013/06/lista-de-campo-2011-2012.pdf>.
- Rimoldi, C. & Pugnali, G. 2013. Lista de campo de la Reserva Costanera Sur. Aves registradas 2013. [Fecha de consulta: Septiembre 2015]. Disponible en: <http://www.reservacostanera.com.ar/wp-content/uploads/2013/06/lista-campo-2013.pdf>.

Recibido: noviembre 2015

Aceptado: mayo 2016