

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO

REVISTA DEL MUSEO DE LA PLATA  
( NUEVA SERIE )

Tomo XIII

1984

Zoología 145

---

ESTUDIOS SOBRE LA AVIFAUNA DE CORRIENTES. I.  
NUEVOS REGISTROS DE AVES (NO PASSERES)

Por

Carlos A. Darrieu (\*)

y

Mariano M. Martínez (\*\*)

El estudio detallado de una importante colección de aves de la provincia de Corrientes, realizada por el Sr. W. H. Partridge, y que se halla depositada en el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", nos permite incrementar el número de especies citadas para la mencionada provincia.

En la presente contribución se incluyen notas sobre cinco especies de No Passeres que se citan por primera vez para la avifauna correntina.

Son pocos los trabajos de conjunto realizados sobre el tema, debiendo mencionarse entre los últimamente publicados los de Short (1971 y 1975) y Contreras (1978, 1979 y 1981). Deben también citarse el de Olog (1978) y el de Meyer de Schauensee (1970) donde figura respectivamente la distribución global en la Argentina y América del Sur de las especies tratadas en esta nota.

---

(\*) Carrera del Investigador CONICET. División Zoología Vertebrados. Museo de La Plata.

(\*\*) Becario CONICET. División Zoología Vertebrados. Museo de La Plata.

Familia *FALCONIDAE*  
*Micrastur ruficollis ruficollis* (Vieillot)

1817. *Sparvius ruficollis* Vieillot, Nouv. Dict. Hist., nat., nouv. ed., 10: 322.

Material examinado: Colonia Garabí, Ea. Rincón de las Mercedes, 1 ♂, 30 Mar. 1962, col. W. H. Partridge.

Esta subespecie estaba citada para el sur y este del Brasil, bosques subtropicales del este del Perú y Bolivia; este de Paraguay y nordeste de la República Argentina en las provincias de Formosa, este de Chaco y Misiones.

El ejemplar estudiado presenta el plumaje dorsal pardo rojizo oscuro, como los juveniles, pero la garganta es de color rojizo como en los adultos.

Las medidas concuerdan perfectamente con las dadas por Blake (1977: 368) para la raza *ruficollis*, sobre todo las correspondientes a la cuerda de ala y culmen, el ejemplar estudiado correspondería a la fase rojiza o "rufa".

Medidas: ala 170, cola 180, culmen 14, tarso 55 mm.

Gonada: 3 x 1 mm.

Familia *CUCULIDAE*  
*Dromococcyx pavoninus* Pelzeln

1870. *Dromococcyx pavoninus* Pelzeln, Orn. Bras. Abth. 3: 270.

Material examinado: Colonia Garabí, Ea. Rincón de las Mercedes, 1 ♀, 31 Mar. 1962, col. W. H. Partridge.

Este cuclillo tiene una amplia distribución en América del Sur, que se extiende desde Venezuela y Guayanas, pasando por Perú, Ecuador y Brasil hasta Paraguay, y en nuestro territorio estaba citado solamente para Misiones, siendo por lo tanto ésta la cita más austral de la mencionada especie.

Medidas: ala 121, cola 165, culmen 18, tarso 29 mm.

Gonada: 4 x 2 mm.

Familia *CAPRIMULGIDAE*  
*Eleothreptus anomalus* Gould

1838. *Amblypterus anomalus* Gould, Proc. zool. Soc. Lond. p. 105.

Material examinado: San Luis del Palmar, Ea. Garabatá, 1 ♂, 2 Dic. 1961; 1 ♀,

23 Nov. 1961; 1 ♀, 1 Dic. 1961, col. W. H. Partridge.

Se distribuye este atajacaminos por Uruguay, Paraguay y sur del Brasil y en nuestro país en Formosa, Chaco y norte de Santa Fe.

De los tres ejemplares estudiados dos presentan la garganta y el pecho de color pardo muy oscuro, casi negro, con manchas en forma de flecha color ante claro; en cambio, el restante presenta dicha zona barreada de ante claro y pardo, con una banda blanca apical en cada pluma, en general, este ejemplar es más claro, sobre todo en la región ventral, caracteres que indican que se trata de un juvenil.

Medidas: Macho, ala 131, cola 86, culmen 12, tarso 19,5 mm.

Hembras, ala 133-138, cola 95-96, culmen 11-13, tarso 18,5-19 mm.

Gonada: Macho, 9 x 6 mm.

Hembra, 5 x 3 (23 Nov.); 1 huevo formado (1 Dic.).

Familia TROCHILIDAE  
*Stephanoxis lalandi loddigesii* (Gould)

1831. *Trochilus loddigesii* Gould, Proc. Comm. zool. Soc. Lond. 1: 12.

Material examinado: Colonia Garabí, Ea. Rincón de las Mercedes, 11 ♂, 1-15 Abr. 1962; 3 ♂, 24-30 Mar. 1962; 1 ♂, s/fecha 1962; 3 ♀, 4-11 Abr. 1962, col. W. H. Partridge.

Esta subespecie se distribuye en el sudeste del Brasil y este de Paraguay, además en el territorio de Misiones en Argentina, siendo por lo tanto esta cita la más austral de la especie.

Esta raza se diferencia de la nominotípica porque los machos poseen la corona azul violeta brillante en lugar de verde, y las hembras por la gran extensión del verde en la base de las rectrices laterales.

A juzgar por el número de ejemplares colectados, parece ser una especie abundante en el norte de la provincia.

Medidas: Machos, ala 49-55 (52,4); cola 37-42 (40,2); culmen 16,5-18 (17,4) mm.

Hembras, ala 50; cola 39-42 (40,3); culmen 17,5-18 (17,6) mm.

Gonada: Macho 1 x 1, 3 x 2 mm (1-15 Abr.); 3 x 1, 2 x 1 mm (24-30 Mar.).

Hembra, 0,5 x 0,5, 2 x 2 mm (4-11 Abr.).

Familia PICIDAE

*Piculus chrysochlorus chrysochlorus* (Vieillot)

1818. *Picus chrysochlorus* Vieillot, Nouv. Dict. Hist. nat. nouv. éd. 26: 98.

Material examinado: Depto. Itatí, Ea. Tuyutí, 1 ♂, 19 Dic. 1961; San Luis del Palmar, Ea. Garabatá, 2 ♂, 23-29 Nov. 1961; 2 ♂, 4-6 Dic. 1961; 1 ♀, 24 Nov. 1961; 2 ♀, 4-6 Dic. 1961, col. W. H. Partridge.

El área de distribución de este carpintero se extiende desde el centro y este del Brasil, hasta Bolivia y oeste de Paraguay y en el norte de la República Argentina, en las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, norte de Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Los ejemplares de Corrientes fueron comparados con otros procedentes del Chaco y Salta, sin encontrar diferencia alguna.

Medidas: Machos, ala 116-122 (120,4); cola 81-88 (85); culmen 21-23,5 (22,3); tarso 18-20 (18,5) mm.

Hembras, ala 117-122 (120); cola 88-90 (88,3); culmen 21,5-22 (21,8), tarso 20-21 (20,5) mm.

Gonada: Macho, 1 x 1 mm (29 Nov.); 6 x 4, 3 x 1, 5 x 3 mm (4-19 Dic.).

Hembra, 2 huevos formados (24 Nov.); 0,5 x 0,5, 4 x 6 mm (4-6 Dic.).

BIBLIOGRAFIA

- BLAKE, E. R. 1977. *Manual of Neotropical Birds*. vol. 1. Univ. Chicago Press.
- CONTRERAS, J. R. 1979. *Avifauna correntina I. Aratinga nenday* (Vieillot) y *Megarhynchus pitangua pitangua* (Linne) (Aves, Psittacidae y Tyrannidae), *Hist. Nat.* 1 (2): 5-8.
- CONTRERAS, J. R. 1981. *Lista preliminar de la Avifauna correntina I. No Passeriformes*. *Hist. Nat.* 2 (3): 21-28.
- CONTRERAS, J. R. y A. O. CONTRERAS. 1978. *Notas acerca de la avifauna de la provincia de Corrientes*. *Neotropica*, 24 (72): 151-153.
- MEYER DE SCHAUENSEE, R. 1970. *A guide to the birds of South America*. Acad. Nat. Sci. Philadelphia.
- OLROG, C. C. 1978. *Nueva lista de la avifauna argentina*. *Opera Lilloana*, 37: 1-324.
- SHORT, L. L. 1971. *Aves nuevas o poco comunes de Corrientes, República Argentina*. *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Zool.* 9 (11): 281-309.
- SHORT, L. L. 1975. *A zoogeographic analysis of the South American Chaco Avifauna*. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* 154 (3): 163-352.