

PTINUS ET ANOBIIDES NOUVEAUX

DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE

recueillis par M. CARLOS BRUCH

Ptinus Bruchi. Large, en majeure partie foncé, roussâtre à l'extrémité des élytres, mat, hérissé de poils clairs ou obscurs, élytres à dessins compliqués; tête moyenne, en partie revêtue de poils orangés; antennes foncées, assez robustes, relativement courtes; prothorax un peu plus long que large, étranglé avant la base, avec 4 oreillettes pileuses, celles du disque assez saillantes et séparées par un sillon, le milieu de cet organe en partie revêtu de poils orangés; écusson étroit, revêtu de poils blancs; élytres foncés, roussâtres au sommet, courts et larges, courtement atténués au sommet, faiblement striés-punctués; épaulés marquées, ces organes ornés largement sur la base (cette pubescence limitée en arrière par une sorte de fascie blanchâtre arquée) de poils gris ou flaves, finement pubescents de gris sur leur milieu, et pubescents de jaune orangé en partie sur la suture et vers le sommet avec, en outre, sur cette dernière partie quelques macules blanchâtres; pattes foncées avec les tibias parfois un peu roussâtres. Long. 3,5 mill. Province de Buenos Aires (coll. Bruch et Pic).

A placer près de *jatahyensis* Pic, mais élytres largement roux à l'extrémité, disposition des dessins différente.

C'est avec un légitime plaisir que je dédie la première espèce de cet article à M. Bruch à qui l'Entomologie doit un certain nombre de découvertes intéressantes.

Xyletinus brasiliensis Pic v. *argentina*. Un peu allongé, peu brillant, entièrement roussâtre-testacé, à pubescence flave assez rude et peu dense; prothorax court et transverse, densément punctué; élytres assez longs, subcylindriques, fortement striés-punctués avec les stries latérales encore plus marquées. Long 5—6,5 mill. Province de Buenos Aires (coll. Bruch et Pic).

Diffère de *brasiliensis* Pic (forma typica) par la pubescence plus rude et les stries plus marquées des élytres.

Cathorama substriata. Un peu allongé, subparallèle, assez convexe, peu brillant, noir de poix, en partie revêtu d'une pubescence soyeuse grisâtre non continue, cette pubescence plus dense sur le dessous du corps; tête fortement sillonnée au milieu, densément pubescente; prothorax assez court, très élargi après le milieu (vu de dessus), arqué antérieurement, subarqué sur les côtés latéraux avec les angles postérieurs et antérieurs arrondis, densément et ruguleusement ponctués sur les côtés, assez densément sur le disque; écusson très large; élytres peu longs, modérément atténués au sommet, irrégulièrement et en partie distinctement ponctués, avec des traces de stries ponctuées faibles, sur le milieu et des stries latérales bien marquées; pattes roussâtres. Long. 3,5 mill. Province de Buenos Aires

A placer près de *fulvopubens* Pic, ayant comme cette espèce un revêtement soyeux, mais celui-ci est plus gris, forme en outre plus allongée, subparallèle, disque des élytres avec des traces de stries ponctuées.

Cathorama subrutiliceps. Assez large, peu convexe, très brillant, finement pubescent de flave, en partie foncé, en partie testacé-roussâtre; tête testacé-roussâtre, assez convexe; prothorax court, modérément diminué en avant, presque droit sur les côtés (vu de dessus), à angles postérieurs arrondis et antérieurs un peu marqués, finement ponctué; élytres courts et larges, un peu étranglés vers le milieu, modérément atténués à l'extrémité, finement et densément ponctués avec quelques points plus gros mais sans stries sur le disque, avec des stries latérales plus ou moins effacées en avant, mais bien marquées à l'extrémité, le sommet parfois un peu roussâtre; dessous du corps et pattes d'un testacé roussâtre. Long. 2,5 mill. Gov. Chubut (coll. Bruch et Pic).

A placer près de *minutissima* Pic, distinct à première vue par sa forme moins convexe et surtout moins atténuée à l'extrémité; diffère en outre de *argentina* Pic par l'aspect plus brillant, la ponctuation générale plus fine.

Digoin (Saône-et-Loire), 1^{er} février 1905.

MAURICE PIC.