

HISPINAE, COCCINELLIDAE et ENDOMYCHIDAE

ARGENTINIA ET VICINITATE E COLLECTIONE BRUCHIANA

Descriptis J. WEISE

HISPINAE

1. *Amplipalpa negligens*: Elongata, parallela, modice convexa, coeruleo-, vel coeruleo-aeneo-nigra, prothorace fulvo, apice macula transversa aenea, disco utrinque impressione antice oblitterata, scutello elytrisque viridi-, vel coeruleo-viridi-aeneis, subtiliter striato-punctatis, alutaceis, subsericeo-micantibus.—Long. 5,6—6,2 mm. Prov. Buenos Aires 24. V. 1903.

Amplipalpa negligens Ws. Archiv f. Naturg. 1905. H. I. 52.

Primo intuitu *Ampl. Pertyi* Guér. (*amiculae* Baly) similis, sed prothorace aliter colorato, apice tantum angustato, lateribus subtiliter et aequaliter marginato, impressionibus sublateralibus minus profundis, antice oblitteratis, elytris obsoletius punctatis ab illa bene distincta.

Antennae nigrae, articulo tertio secundo duplo longiore. Prothorax longitudine dimidio latior, lateribus subparallelis, apice rotundatim convergentibus, dorso parum convexus, flavido-rufus, nitidus, sublaevis, utrinque longitudinaliter late impressus, impressione sat crebre punctata, macula transversa brevi apicis loboque medio basali nigro-aeneis. Scutellum viridi-aeneum, alutaceum. Elytra prothorace vix latiora, subparallela, apice conjunctim rotundata et parce obsoleteque serrulata, superne modice convexa, viridi-, vel coeruleo-viridi-aenea, subtilissime alutacea, subsericeo-micantia, subtiliter, latera versus paulo fortiter striato-punctata, seriebus nona et decima discretis. Corpus subtus coeruleo-, vel subaeneo-nigrum, lateribus prosterni fulvis.

2. *Cephalolia funesta* Baly. Gob. Misiones 2. VIII. 1904.

3. *Cephalolia tucumana* Ws. Deutsch. Zeit. 1904. 439: Elongata, depressiuscula, nigra, nitidula, vel subopaca, prothorace dense punctato, linea media laevi, elytris subtiliter punctato-striatis, basi late rufo-flavis, tibiis apice extremo tarsisque rufo-testacisis.—Long. 5—5,8 mm. Prov. Tucuman (IX. 1897).

5 Minor, angustior, segmento ultimo ventrali apice profunde lateque emarginato.

Statura et summa similitudo *C. histrionis* F., sapra vix nitida, prothorace crebrius fortiusque, fere ruguloso-punctato, linea media angusta et plagula antica utrinque laevibus, elytris minus profunde subtilius punctato-striatis, plus quam dimidio postico nigris; segmento ultimo ventrali maris apice profundius emarginato, ab illo distincta.

4. **Cephalolia opaca** Baly. Brasilia IX. 1901.

5. **Cephalodonta juncta**: Elongata, testaceo-flava, subopaca, prothorace subferrugineo, creberrime punctato, elytris fere parallelis, angulo laterali postico in spinam nigro-violaceam retrorsum productis, dorso 4-costatis, costa secunda crassiuscula, caeteris sat obsoletis; aeneo-reticulatis, reticululo maculis novem (internis communibus) includente.— Long. 7,5—8,3 mm. Brasilia (VII. 1901).

Ceph. Pascoei Baly proxima, minor, aliter colorata. Fronte subconvexa, sublaevi, medio foveola impressa, antrorsum angulatim producta. Antennae filiformes, flavae, articulis quatuor ultimis brevibus, testaceis, articulo primo sat crasso, brevi, secundo longiore, 3° secundo parum longiore, quarto longissimo, tertio paullo longiore, 5° tertio, 6° secundo longitudine fere aequali. Prothorax latitudine postico vix brevior, ante medium angustatus, angulis anticis modice productis subacutis, supra parum convexus, medio longitudinaliter subdepressus, ferrugineus, densissime punctatus. Scutellum ferrugineum, subnitidum, laeve. Elytra elongato-quadrata, prothorace latiora et illo plus quam triplo longiora, basi leviter rotundatim producta, humeris extrorsum prominulis apice acutis; dein subparallelia, apice leniter rotundato angulo laterali in spinam validam acutam, supra convexam, retrorsum et parum lateraliter producta; dorso deplanata, decepta, basi extremo undecim-seriato-punctata, 4-costulata, costa secunda crassiuscula, caeteris angustissimis et parum elevatis; testaceo-flava, singulo vitta triangulata lineaque transversa ante apicem obscure aeneo-viridis maculis novem testaceo-flavis subincludentibus notata; nempe macula prima transversa, in basi, seunda pone scutellum, subrotundata, communi, tertia (pone humerum), quinta et septima oblongis prope marginem lateralem sitis; maculis 4^a, 6^a, 8^a et 9^a transversis, magnis, communibus, ad suturam (nona excepta) inter se conjunctis. Corpus subitus testaceo-flavum, pedes dilutiores, longis, tibiis anticis maris dente parvo armatis.

6. **Cephalodonta Bruchi** Ws. Deutsch. Zeit. 1904. 443: Elongata, supra laete viridis, antennis (articulis 4 ultimis nigris exceptis), thoracis basi et apice, elytrorum limbo (hoc parce cupreo-maculato) pedibusque

testaceo-flavis, elytris angulo postico obtuso, disco regulariter punctato-striatis, subitus aeneo-nigra, ano testaceo.— Long. 4,3—5 mm. Prov. Buenos Aires (10, l. 1897).

Cephalod. clarae Ws. proxima, minor, elytris dorso seriebus septem punctorum regulariter impressis, limbo laterali testaceo-flavo ornatis angulo postico obtuso facile distinguenda.

7. *Charistena basalis* Baly. Brasilia III. 1901.

8. *Chalepus Haroldi* Chap. Prov. Buenos Aires 20. IV. 1904.

9. *Chalepus medius* Chap. Prov. Buenos Aires 24. V. 1904.

Species a congenibus semper distinguenda: Fronte trisulcata, sulcis lateralibus profundioribus, antennae apicem versus angustatae, articulis (tertio et ultimo exceptis) fortiter transversis, tertio maximo, ultimo apice angustato, valde compresso, oblique truncato; prothorace dorso postico deplanato et leviter impresso, lobo medio basali sublaevi, sulco medio transverso diviso.

Spec. e Gobern. Misiones (1. VIII. 1904) variat elytrorum fascia antica fere deleta, e striolis nonnullis leviter infuscatis composita.

10. *Chalepus alienus* Baly. Argentinia: Gob. Formosa (II. 1895). Brasilia (Dr. Kraatz), Yatahy (Donckier).

Pedes nigri, femora basi fulva. Variat a) femoribus intermediis macula baseos parva, femoribus posticis omnino nigris, b) femoribus intermediis nigris, posticis macula basali rufescente, c) femoribus posterioribus omnino nigris; d) abdominis segmento primo vel segmentis duobus primis fulvis.

11. *Chalepus dictyopterus* Perty Brasilia 19. V. 1901.

12. *Chalepus flaveolus* Chap. Brasilia 19. X. 1901.

13. *Chalepus trilineatus* Chap. Brasilia 19. VIII. 1901.

14. *Chalepus axillaris* Duv. Gob. Misiones (III. 1905); Prov. Tucuman (17. l. 1903).

Vitta fulva elytrorum, a basi lateraliter usque pone medium extensa, interdum brevior, latera haud attingens, ante medium, vel non longe pone basin abbreviata.

15. *Chalepus stigmula* Chap. Brasilia 20. XI. 1901.

16. *Chalepus laetificus*: Elongatus, fulvus, capite antennisque nigris, vertice nigro-chalybaeo, prothorace fortiter et dense punctato, elytris parallelis, quadricostatis, macula communis anchoraeformis et tertia parte apicali chalybaeo-nigris, macula prosterni utrinque, abdomine (segmento primo excepto) pedibusque nigro-aeneis, episternis metasterni infuscatis.—Long. 6 mm. Gobern. Formosa (Il. 1895).

Chal. verticali proximus, vix minor, prothorace subconico nec non scutello, pectore ventrisque segmento primo fulvo-rufis, elytris apice evidenter serrulatis, humeris magis prominulis, ab illo bene distincto.

Frons sublaevis, trisulcata, clipeus subquadratus, creberrime granuloso-punctatus, antennae dimidio corporis breviores, crassiusculae, articulis septem primis obsoletius longitudinaliter sulcati, articulo secundo brevi, transverso, tertio longissimo, praecedentibus longitudine aequali, articulis 4—10 (sexto brevi excepto) inter se fere aequalibus, transversis, ultimo oblique acuminatum penultimo longiore. Prothorax transversus, basi coleopteris angustior, antrorum angustatus, lateribus leniter bisinuatus, subconicus. Elytra prothorace fere quadruplo longiora, pone humeros angulatos parallela, minute serrulata, apice subconunctum late rotundata, evidentius serrulata, dorso deplanata, regulariter et fortiter 10-seriato-punctata, serie adjecta in sulco brevi scutellari impressa, 4-costata, costa tertia medio interrupta.

17. *Stethispa Bruchi*: Sat elongata, fulva, parum nitida, prothorace linea media rufa vittaque sublateralis nigricante, elytris subparallelis, apice communiter rotundatis, angulo postico et humeris in spinam acutam lateraliter productis, dorso fasciis tribus (anterioribus obliquis) sat obsoletis subpurpureis, femoribus basi tibiisque flavescentibus.—Long. 5,5 mm. Gob. Misiones (V. 1895).

Steth. conicicollis minor, praesertim brevior sed parum angustior, aliter colorata, spina humerali basi crassiore. Antennae fulvae. Prothorax longitudine dimidio latior, lateribus postice subparallelis, antice convergentibus, angulis anticis productis, acutis; dorso minus convexus, medio parcelatera versus crebrius punctatus, utrinque vitta nigricante supra marginem ornatus. Elytra 4-costata, costis duabus primis crassioribus, seriebus punctorum quatuor anterioribus regularibus, caeteris minus regularibus; humeris spina acuta, basi lata, valde lateraliter extensis, spina postica humerali subaequali, paullo retrorsum curvata, in dorso longitudinaliter elevata. Pedes fulvi, femoribus basi flavescentibus, intermediis apice emarginatis obtuseque subdentatis.

18. *Baliosus rubiginosus* Guér. Gob. Misiones (III. 1895) specimenibus brasiliensis congruus, sed minor, angulo positico elytrorum in laminam minus validam lateraliter magis abrupte producto.

19. *Baliosus parvulus* Chap. Brasilia III. 1901. Tucuman XII. 1899.

20. *Probaenia crenata* Blanch. Brasilia IX. 1901, et aberr. *nigripes* Chap. Prov. Tucuman XI. 1899.

21. *Probaenia infirmior*: Sat elongata, nigra, prothorace elytrisque testaceo-flavis, hoc crebre, medio disci parce punctato, vittis tribus nigris vel nigro-aeneis ornato, elytris quadricostatis, costis duabus interioribus modice elevatis, exterioribus tenuibus; macula communis transversa baseros, limbo suturali (pone medium vel ante apicem interrupto), fascia ante medium introrsum valde angustata plaga magna apicis nigris, hac maculam transversam communem testaceo-flavam cingente, angulo laterali-postico subacuto oblique producto.—Long. 5,6—6,2 mm. Prov. Buenos Aires XI. 1903.

Prob. crenatae Blanch. simillima, nonnihil minor, praesertim angustior, prothorace medio disci parcius punctato, vittis nigris antice haud abbreviatis, elytris punctis serierum fortioribus sed remotioribus, costis internis nonnihil latioribus et parum elevatis, macula basali nigra transversa, margine apicali spinulis parvis circiter sex armatis ab illa distincta.

22. *Probaenia fasciata*: Elongata, nigra, pectoris medio marginibus segmentorum ventralium rufescensibus, pedibus flavis, supra testaceo-flava, subnitida, prothorace transverso, subconico, crebre punctato, disco vittis tribus aeneo-nigris, media canaliculata, elytris oblongo-quadratis, striato-punctatis, 4-costatis, costa tertia medio interrupta, apice quartae connexa, angulo postico in dentem mediocrem, acutum, supra concavum, lateraliter productus, fasciis quatuor vittaque laterali a basi ad medium fusco-viridi-aeneis ornatis: fascia prima subbasali, secunda ante-, tertia pone medium, omnibus cum vitta laterali cohaerentibus, quarta in apice; spina solitaria femorum antidorum mediocri. — Long. 5,5—6 mm. Brasilia IX. 1901.

Prob. vittulosa m. affinis, subtus obscurior, fronte testacea, fasciis elytrorum integris spina angulorum posticorum evidenter breviore bene discreta.

23. *Probaenia venusta* Chap. Brasilia IX. 1901.

24. *Ochthispa elongata* Chap. Gob. Misiones III. 1897. Tucuman 30. I. 1904.

25. *Ochthispa fossulata* Chap. Prov. Tucuman XII. 1899.

26. *Octhispa Robinsoni* Baly. Brasilia III. 1901.

27. *Uroplata* (¹) *8-pustulata* Baly Brasilia IX. 1901.

28. *Uroplata cruenta* Baly. Brasilia IX. 1901.

29. *Uroplata plagipennis* Chap. Brasilia VIII. 1901.

30. *Uroplata ferruginea* Ws. Archiv f. Naturg. 1905. 88. Prov. Tucuman IX et XII. 1899.

Accedit specimen paullo majus, praesertim latius, elytris viridi-aeneo-infuscatis, maculis parvis fulvis bene discretis.

31. *Heterispa orientalis*: Nigra, clipeo, fronte antica, pro- et mesosterno femoribusque flavis, his supra nigris, prothorace crebre punctato, flavo, maculis tribus nigris, duabus marginalibus, tertia discoidali, majore, rotundato-quadrata, basin vel apicem haud attingente, interdum lateralibus connexa, elytris nigris, opacis, macula humerali aurantiaca notulaque apicale flava.—Long. 5—5,5 mm. Brasilia III. 1901.—Santos, Bahía, Espírito Santo, Blumenau (Staudinger, Reitter).

Var. a. Elytris interstitio externo, basi apiceque excepto, flavis.

Heterispis vinulae et *costipenni* intermedia, illa minor, praesertim brevior, antennis brevioribus, articulo septimo paullo crassiore, ultimo minus elongato differt; statura et summa similitudo *H. costipenni*, sed antennis longioribus, apice vix claviformibus, prothorace elytrisque obscurius coloratis, macula humerali rufa elytrorum haud quadrata sed triangulari ab illa certe distincta.

(¹) *Uroplata longipes*: Elongata, apice paulo dilatata, subtus nigra, prosterno, pectoris medio, abdominalis plaga basali femoribusque anticis basi fulvis, supra fulva, subopaca, prothoraci margine laterali et vitta media elytrorumque macula communis anchoraeformi nec non fere tertia parte apicali nigris; elytris 4-costatis, angulo postico lateralii unispinoso, pedibus valde elongatis.—Long. 7 mm. Obidos, Amazonas (Rolle).

Caput fulvum, sublaeve, ore colloque infuscatus. Antennae nigrae, articulis sex primis sat gracilibus, caeteris paullo incrassatis, articulis duabus primis laevibus, subelongatis, secundo antecedenti parum tenuiore, tertio secundo quartoque dimidio longiore, quinto quarto breviore, sexto brevissimo, septimo sexto dimidio longiore, octavo clavam elongatam subcompressam, apice subacuminatam, formante. Prothorax leviter convexus, sat crebre punctatus, medio tenueri canaliculatus, lateribus parum rotundatus antros convergentibus. Scutellum nigrum. Elytra prothorace latiora, subparallela, pone medium sensim ampliata, apice communiter rotundata et subtiliter serrulata, angulo postico in densem acutissimum oblique producto; modice 4-costata, costa tercia medio interrupta; regulariter decem-seriato-punctata, serie adiecta scutellari brevi; nigra, macula oblonga baseo fasciaque pone medium valde obliqua fulvis: macula humerum amplectente, costam primam basi solum attingente, retrosum leviter angustata et usque fere tertiam partem longitudinis prolongata, apice obtusa; fascia, quae marginem externum et suturam omnino tangit, extrosum leviter dilatata, obliqua, in sutura a basi magis distante quam in margine externo. Pedes sat graciles, valde elongati, nigri, femoribus anticis fere dimidiis basali parte fulvis, cacteris macula parva, obsoleta, rufescente, prope basio dorsi signatis.

32. *Heterispa costipennis* Boh. Prov. Buenos Aires sat frequens.
XI. 1897.

33. *Bruchia* n. gen.

Corpus parvum, sat elongatum. Antennae breves, crassiusculae, septem-articulatae, articulis quinque primis exakte separatis, articulis tribus primis brevibus, sat transversis, duobus sequentibus brevissimis, duobus ultimis subconnexis paulo incrassatis, articulo sexto subtransverso, praecedentibus binis haud longiore, ultimo subovato, acuminato. Fronto subdeplanata, obsolete longitudinaliter striolata, linea media impressa. Prothorax coleopteris multo angustior, latitudine sua vix longior, basi apiceque latitudine aequalis, lateribus deflexis marginatus, fere parallelus, basi leniter rotundatus; disco transversim convexus, subseriatim punctatus, linea media tenui impressus. Scutellum parvum, quadratum. Elytra prothorace vix triplo longiora, humeris magnis extrorsum subdilatatis, lateribus pone humerum subparallelia, apice communiter rotundata, dorso parum convexa, minus regulariter 8-seriatim punctata leviter bicostata (costa tertia deficiente), costis valde interruptis, ante apicem transversim connexis. Pedes mediocres, femoribus muticis, tibiis rectis, unguiculi divergentes.

Senus certe *Physocorynae* affine, sed antennarum articulis quinque primis tantum evidenter separatis ab Hispinis omnibus distinctum.

Unicam speciem mihi notam describam:

Bruchia sparsa: Nigra, opaca, pedibus maculisque septem minimis in elytro singulo flavis: 2, 2, 3.—Long. 2,5 mm. Prov. Buenos Aires, La Plata (10. XI. 1903).

Coloptera atra, maculis 14 obsoletis notata, prima linearis, basin costae primae obtegente, caeteris punctiformibus, secunda pone scutellum prope suturam, tertia et quarta ante medium valde oblique digestis, quinta, sexta et septima pone medium, seriem transversam formantibus.

COCCINELLIDAE

1. *Solanophila albovittata*: Subhemisphaerica, nigra, subtus parce-, supra dense brevissimeque cupreo-pubescentis, antennis medio testaceis, elytris crebre punctatis et densissime punctulatis, singulo vittis duabus postice abbreviatis albidis, albido pubescentibus. — Long. 7,5 mm. Prov. Salta.

Species pictura elytrorum omnino insignis. Antennae testaceae, articulo primo clavaque nigris. Prothorax crebre punctulatus. Elytra prothorace plus quam quintuplo longiora et ejus basi paulo latiora, antice utrinque subtruncata, humeris rotundatis lateribus a basi vix ad medium sensim rotundato-dilatata, dein angustata, apice conjunctim acute-rotundata, supra convexa, nigra, obsolete aeneo-micantia, vittis duabus albidis postice abbreviatis: prima prope suturam, medio paullo angustata, secunda in disco exteriore pone humerum. Lineae ventrales magnae, integrae, rotundatim angulatae.

2. *Solanophila*⁽¹⁾ *pilifera* Ws. Individua hujus speciei, in Prov. Jujuy 14. XI. 1903 D. Bruch legit, variant corpore subtus aeneo-nigro, supra nigro-metallico-coeruleo, elytris paulo fortius punctatis et longius albido-pilosis, apice in mare haud acuminatis, fascia latissima communi laete rubra postice semper biarcuatim terminata.

3. *Megilla 4-fasciata* ab. *pustulata* Muls. Prov. Buenos Aires.

4. *Coccinella emarginata* Muls. Gob. Neuquen IV. 1898.

5. *Coccinella eryngii* ab. *chilena* Ws. Gob. Neuquen III. 1898.

(¹) *Solanophila graphis*: Breviter-ovalis, modice convexa, dense subtiliter cinereo-pubescentis, nigra, antennis articulis 2-7 angulisque anticis prothoracis obsoletius ferrugineis, elytris crebre punctulatis et minus crebre punctatis, testaceis, nigro-circumcinctis, vitta subrecta, paulo ante apicem abbreviata fasciaque angusta obliqua ante medium nigris. — Long. 6 mm. Bolivia: Yungas de La Paz (Rolle).

Solanoph. ostensae Ws. similis, supra densius pubescens, prothorace subopaco, elytris subtiliter punctulatis et fortiter minus dense punctatis, margine lateralí parum explanato, subdeflexo. Elytra testacea, limbo nigro suturali pone medium sensim angustato; limbo lateralí vix ante medium abrupte dilatato dein sensim angustato; fascia obliquè introrsum ducta et suturam longe ante medium contingente; vitta longitudinali sat lata, parallela, sutura magis propinguia quam margine. Reticulo nigro areolas elongatas testaceas quatuor includente: duabus ante medium, primo, prope suturam, subparallela, secunda, supra marginem, majore, trianguli; duabus pone medium, subpara lefis, ante apicem connexis, interna longissima.

6. *Coccinella* (?) *Germaini* Crotch. Revis. 106. Prov. Buenos Aires et in Chili. Ovalis, convexa, nigra, supra nitidissima, ore, antennis, tibiis apice tarsisque obscure testaceis, fronte macula utrinque albida, prothorace elytrisque subtilissime punctulatis, illo antice et in lateribus anguste albo-limbato, his testaceo-flavis, disco medio subalbido macula magna et fasciis binis (prima ante-, secunda pone medium, medio longitudinaliter connexis) composita, nigra.—Long. 3,5—4 mm.

Variat: Elytris nigris, limbo angusto laterali, paullo ante medium in maculam semiellipticam dilatato, longe pone medium abbreviato, maculisque tribus in singulo albis: prima basi prope scutellum, secunda medio, rotunda, tertia ante apicem prope marginem lateralem⁽¹⁾.

7. *Exochomus bimaculosus* Muls. Prov. Jujuy 1901.

8. *Cleothera ferruginiceps*: Oblonga, nigra, nitida, ore antennis, lateribus prosterni ventreque testaceis, capite limboque apicali prothoracis ferrugineis, prothorace dense subtilissimeque punctulato, lateribus flavo-limbatis, elytris subparallelis, apice rotundato-truncatis, supra dense subtilissime punctatis, singulo maculis quinque flavo-albidis: 2, 2, 1, ultima transversa, arcuata, ante apicem.—Long. 5 mm. Prov. Tucuman 1. III. 1900.

Inter majores sui generis et a congeneribus corpore oblongo, lateribus vix rotundato, capite margineque antico prothoracis ferrugineis facile dignoscenda. Elytra maculis quinque flavo-albidis, duabus basalibus, duabus submediis, ultima ante apicem. Macula prima rotundata quadrata, prope scutellum, secunda triangulari, in angulo humerali sita, tertia rotunda, prope suturam, quarta oblonga juxta marginem lateralem, quinta margine postico elytri parallela, intus antrorum curvata. Unguiculi appendiculati.

9. *Cleothera exclamationis* Muls. (sub. *Hyperaspis*) Prov. Buenos Aires 20. I. 1905. Paraguay (Drake).

Elytris nigris, vitta discoidali, pone basin paralelo angustato et longe pone medium abbreviata, vittaque laterali apicem versus leniter dilatata et a margine postico separata flavo-albidis.

10. *Hyperaspis scapulata* Muls. (*mercabilis* Muls. non Crotch) Prov. Tucuman 9. XI. 1903. Duas tantum feminas in Argentinia D.

(1) *Cycloneda pusilla*: Subhemisphaerica, nigra, nitida, ore, antennis, femoribus anticis (basi excepta), tibialis tarsisque anticis, nec non tibiis intermediis apice et tarsis testaceis; prothorace valde transverso, dense punctulato, macula magna lateral, fere tertiam partem latitudinis occupante, intus valde arcuatim terminata, albida; elytris dense punctulatis, macula sat magna, submedia, transversa, rotundata, fulva signatis.—Long. 3 mm. Prov. Entre Rios (Rolle).

Bruch legit, quae a jamdiu descriptis variant femoribus piceis, apice testaceis, femoribus anticis interdum omnino rufescens; macula tertia elytrorum semper elongata, limbo laterali flavo integro vel interrupto et in maculas duas (secunda et quarta) diviso. Tibiae anticae in margine exteriore dentem parvum pone basin armatae.

11. **Diomus tucumanus:** Ovalis, convexiusculus, subtus niger, lateribus prosterni, pedibus et interdum ventris apice testaceo-flavis; supra testaceo-flavus sat dense et brevissime pallide pilosus, nitidus, scutello clytrorumque signaturis nigris, nempe macula magna communis baseos, sutura, limbo sat lato laterali, postice marginem apicalem haud obtegente, macula media angulata, in disco exteriore, limbum lateralem connexa, lineaque circulari communis submedia, antice abbreviata.— Long. 1,5—1,7 mm. Prov. Tucuman 9. III. et 4. VII. 1900.

Ab. a. Elytris testaceo-flavis, limbo angusto suturali et lateralii, postice abbreviatis, nigris, fascia tenui, brevi, communis ante apicem fusca.

Statura fere *D. ochroderi*, paullo angustior, minus convexus, supra obsoletissime punctulatus. Caput parvum, subtriangularis, fronte sublaevi. Prothorax basi coleopteris paullo angustior, latitudine sua triplo brevior, apice quam basi angustior, lateribus leniter rotundatis, disco subtilissime punctulatus, fere laevis. Elytra prothorace quadruplo longiora, lateribus leniter rotundata, apice rotundato-truncata, tuberculo humerali minimo; subtiliter obsoleteque punctulata. Prosternum planum, sublaeve, latiusculum, carinis antrorsum leviter convergentibus.

12. **Pullus argentinicus:** Subellipticus, convexus, piceus, cinereo-pubescent, sericeo-micans, capite, lateribus prothoracis, ano pedibusque aut fulvis (♂), aut ferrugineis (♀), elytris crebre punctulatis, pone medium sensim dilutionibus, apice flavescentibus. — Long. 1,8—2 mm. Prov. Tucuman. III. 1900.

♂ Segmento quinto ventrali apice impressione parva instructo. *P. apicalis* nonnihil minor, praesertim angustior, elytris crebrius apice quam basi paullo fortius punctatis, ut et colore dilutione ab illo facile distinctus.

Prothorax basi coleopteris paullo angustior, latitudine sua plus quam duplo brevior, apice quam basi angustior, lateribus sat rotundatis, dorso subtilissime punctulatus, medio piceo latera versus sensim dilutior. Elytra prothorace haud quadruplo longiora, apice subgranuloso-punctulata, tuberculo humerali sat magnio. Lineae ventrales integrae, subterminales, extorsum parum curvatae. Prosternum punctatum, carinis antrorsum parum convergentibus.

13. *Ladaria rufopunctata* Crotch. Brasilia 15? Capite, prothoracis limbo angusto apicali extrorsum dilatato pedibusque testaceo-flavis, femoribus posticis (apice excepto) nigris.

14. *Oryssomus varius* Crotch. Chili.

ENDOMYCHIDAE

Rhymbus Bruchi: Ovalis, convexus, brunneo-rufus, supra sat dense et sat breviter flavo-cinereo-pilosus, nitidus, ore, antennis pedibusque flavescentibus, prothorace obsolete punctulato, fere laevi, sulcis laterilibus subintegris, elytris subtiliter punctatis. — Long. 1,3—1,5 mm. Prov. Buenos Aires. 25. V. 1903 (C. Bruch).

E minoribus, sulcis prothoracis apice transversim connexis, ab affinis valde distinctus. Caput obsolete punctulatum, antennae prothoracis basin haud superantes, articulis tribus primis sat elongatis, sensim tenuioribus, articulis sequentibus tribus minusissimis, 3 ultimis incrassatis, clavam articulis praecedentibus paulo breviorem formantibus; articulo septimo sat parvo, crassitie sua vix longiore, octavo transverso, praecedente haud longiore, ultimo magno, rotundato-subquadrato. Prothorax basi coleopteris paucum angustior, latitudine sua plus quam duplo brevior, apice utrinque minus profunde emarginatus medio truncatus, quam basi valde angustior, angulis anticis subprominulis; lateribus rotundatus, marginatus, basi utrinque sinuatus, obsolete marginatus, angulis posticis obtusis, subrotundatis; disco transversim leviter convexus, nitidus, obsolete, vix sibiliter punctatus, sulcis sublateralibus curvatis, margine externo fere parallelis, sat profundis, paulo pone apicem lineam transversam dense punctulatam connexis. Scutellum minimum. Elytra prothorace plus quam triplo longiora, callo humerali parvo, lateribus leviter rotundata, apice angustata, disco sat convexa, subtiliter sed evidenter sat dense punctata, nitida. Prosternum antrorum assurgens, bicarinatum, carinis convergentibus antice in processum labialem brevem excurrentibus.

J. WEISE.