

Descriptions de Coléoptères nouveaux

DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE (*)

par MAURICE PIC

Hadrotoma argentina. Oblongus, sat latus, subconvexus, nitidus, fulvo pubescens, sparse punctatus, niger, elytris ad basin testaceo fasciatis et apice testaceo notatis, antennis pedibusque testaceis.

Oblong, assez large, faiblement convexe, brillant, éparsément ponctué et revêtu d'une pubescence flave en partie soulevée; noir avec les élytres ornés d'une large fascie antérieure, et d'une grande macule apicale, testacées, antennes et pattes testacées. Tête petite, yeux saillants; antennes testacées; prothorax court, en arc de cercle antérieurement; sinué à la base; élytres relativement courts et larges, un peu diminués et subarrondis à l'extrémité, sans impression basale, noirs et ornés près de la base d'une large fascie complète testacée, remontant un peu latéralement vers les épaules, ainsi que d'une grande macule apicale de même coloration; dessous du corps foncé; pattes testacées. Long. 2,3 mill. Province de Tucuman.

Cette jolie petite espèce rappelle beaucoup *H. rufogullata* Pic, de Turquie d'Asie, mais sa forme est moins allongée, la ponctuation du prothorax plus fine et très écartée, la bande antérieure testacée paraît plus large.

? *Carphurus opacus*. Modice elongatus, parallelus, subdepressus, opacus, niger, elytris viridescens, antennarum basi, tibiis tarsisque pallidis, abdomine nigre, producto.

(*) Les insectes étudiés ici m'ont été communiqués par M. C. Bruch à qui l'entomologie est déjà redevable de plusieurs découvertes intéressantes.

Modérément allongé et parallèle, subdéprimé, opaque, noir avec les élytres verdâtres, la base des antennes, les tibias et les tarsi testacés. Tête grosse, de la largeur du prothorax, très densément ponctuée avec les yeux assez saillants; antennes insérées latéralement un peu en avant des yeux, assez longues, robustes, un peu dentées à partir du 4^e article, foncés avec les 2 à 4 premiers articles testacés; prothorax assez court et large, de la largeur des élytres en arrière, un peu diminué aux deux extrémités, rebordé-explané sur la base et les côtés postérieurs, très densément ponctué; élytres à peine brillants et seulement sur le calus scutellaire, parallèles, peu longs, obliquement tronqués au sommet, munis d'une dépression présuturale assez profonde, épaules bien arrondies, ponctuation forte et peu serrée antérieurement, ruguleuse et plus serrée ensuite; abdomen noir, dépassant longuement les élytres; pattes robustes, testacées avec les cuisses foncées. Long. 3,5 mill. Province de Buenos Aires.

C'est avec doute que je place dans le genre *Carphurus* Er. cette nouveauté qui pourrait bien faire partie d'un genre nouveau. L'étude des deux sexes de cette espèce, et l'examen ultérieur d'exemplaires bien conservés et frais, permettront plus tard d'étudier mieux cette nouveauté et d'élucider cette question générique. Dans tous les cas, cette nouveauté est, comme *Malachide*, très distincte par sa forme et son aspect mat avec son abdomen débordant les élytres.

Anthicus pallidicolor. *Oblongus, nitidus, griseo pubescens et pilis pallidis hirsutus, pallido testaceus, oculis nigris; capite postice subarcuato, nitidissimo; thorace breve, sinuato, rugoso punctato; elytris latis, anterius sat grosse punctatis.*

Oblong, brillant, pubescent de gris et hérissé de longs poils clairs, testacé pâle avec les yeux noirs. Tête très brillante, peu ponctuée, un peu diminuée derrière les yeux et subarquée en arrière; antennes testacées, moyennes, légèrement épaissies au sommet; prothorax court, sinué sur les côtés, modérément et presque subanguleusement dilaté en avant du milieu à peine brillant, orné d'une ponctuation ruguleuse forte et dense, légèrement crénelé sur les côtés; élytres larges et peu longs, un peu atténués au sommet, à épaules presque droites avec une assez forte impression près de la base et des bossettes scutellaires distinctes, ponctuation forte et peu écartée, s'effaçant en arrière; pattes assez longues, cuisses un peu épaissies. Long. 3 mill. Province de Buenos Aires.

Cette espèce est très distincte, parmi les espèces testacées, par la tête très brillante jointe à la sculpture de son prothorax qui copie un peu certains *Acanthinus*, sans rentrer dans ce groupe; on peut la placer dans le voisinage de *setosus* Laf., des Indes Orientales.

Anthicus postsignatus Pic var. **innotatipennis**. *Elongatus, parum nitidus, testaceus, oculis nigris, elytris immaculatis.*

Allongé, peu brillant surtout sur l'avant corps, entièrement testacé avec les yeux noirs; tête et prothorax densément ponctués, un peu rous-sâtres; antennes courtes; élytres longs, subparallèles, immaculés, un peu brillants, à ponctuation forte et assez rapprochée, d'une coloration plus claire que l'avant corps. Long. 3,5 mill. Province de Buenos Aires.

Variété distincte, à première vue, par l'absence sur les élytres de macule foncée postsuturale.

MAURICE PIC.