

DESCRIPTION DES CLAVICORNES NOUVEAUX

DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE

PAR A. GROUVELLE

Membre honoraire de la Société Entomologique de France

NITIDULIDAE

TELOCONUS n. gen.

Caput oculis haud maximis, tota capitis latera haud occupantibus; epistomo porrecto; sulcis antennalibus brevibus, convergentibus; labro modice producto, integro; mandibulis apice simplicibus. Elytra elongata, striata. Abdomen conicum, sat late marginatum, 3° segmento in maxima parte et duobus ultimis expositis; 2° quam aliis brevior, 1° et 3° subaequalibus quam 4° paulo longioribus, 5° quam aliis multo longiore.

Nouveau genre voisin comme aspect général des *Goniorhynchus* Sharp.

Teloconus mirificus n. sp.

Suboblongus, postice valde acuminatus, fere quinque longior quam in maxima latitudine lator, modice convexus, nitidus, abdomine praecipue ad apicem tenuiter flavo-pubescentis, rufo testaceus; elytris extra late regionem scutellarem nigris. Antennae aliquid elongatae; clava oblonga, 1° articulo quam 2° longiore, 3° quam praecedentibus angustiore. Caput transversum, antice truncatum, subdense punctatum, inter antennarum bases transversim impressum et bipunctatum; fronte epistomique sat convexis, hoc antice inflexo; oculis antennarum basin fere attingentibus; temporibus retrorsum conver-

gentibus. Prothorax antice quam postice paulo angustior, lateribus arcuatus, circiter $1\frac{2}{3}$, in maxima latitudine latior quam longior, subdense punctatus; punctis basin versus majoribus; margine antico truncato ad extremitates tenuiter marginato; angulis anticis obtusis, subhebetatis; lateribus tenuiter marginatis; angulis posticis hebetatis, obtusis; basi truncata extra medium tenuiter marginata. Scutellum subpentagonale, punctatum. Elytra humeris rotundata, tunc quam prothorax latiora, lateribus subrufa apice oblique truncata, angulis externis late rotundata, suturalibus obtusa, circiter $1\frac{1}{5}$ longiora quam simul in maxima latitudine latiora, punctato-substriata; striis paulo ante apicem evanescentibus; intervallis latis, subconvexis, unilineato-punctulatis. Abdominis segmenta dense punctulata. Corpus subtus fulvo-testaceum. — Long. : 7,5 mm.

Suboblong, fortement et longuement acuminé vers le sommet de l'abdomen, presque cinq fois plus long que large dans sa plus grande largeur, modérément convexe, brillant, glabre sur l'avant-corps, couvert sur l'abdomen d'une pubescence flave, fine, progressivement plus marquée vers l'extrémité, roux testacé; élytres noirs, sauf une très large tache triangulaire, s'étendant entre les épaules et s'avancant sur la suture, et une très étroite bordure sur les côtés et le sommet des élytres. Antennes relativement longues; 3^{me} article près de trois fois aussi long que large; massue plus d'une fois et demie aussi longue que large; dernier article, plus étroit que le précédent. Tête un peu moins de deux fois plus large au niveau des yeux que longue, tronquée au bord antérieur; côtés parallèles contre le bord antérieur, sinués presque en quart de circonférence en avant de l'insertion de l'antenne, sinués et divergents vers l'arrière entre les yeux, enfin obliquement convergents à partir de la base de l'orbite de l'œil; front et épistome assez convexes, séparés par une large impression transversale, peu profonde, terminée de chaque côté par un point enfoncé; ponctuation irrégulière, plus dense et moins forte sur l'épistome que sur le front. Yeux moyennement gros et saillants, occupant l'intervalle entre l'insertion de l'antenne et la base de la tête. Prothorax un peu moins large en avant qu'à la base, à peine plus large en avant que la tête avec les yeux, faiblement arqué sur les côtés, présentant sa plus grande largeur vers les deux cinquièmes de la longueur à partir de la base, subparallèle contre la base, environ une fois et deux tiers plus large dans sa plus grande largeur que long, presque densément ponctué; bord antérieur tronqué, finement rebordé aux extrémités; angles antérieurs obtus, un peu émoussés, côtés finement rebordés; angles postérieurs obtus, émoussés; base finement rebordée sauf au milieu. Ecusson subpentagonal, presque deux fois plus large à la base que long, assez densément pointillé, lisse au milieu de la

marge basilaire. Élytres arqués à la base, arrondis aux épaules, alors très nettement plus larges que le prothorax dans sa plus grande largeur, arqués, modérément élargis sur les côtés, présentant leur plus grande largeur vers le premier cinquième de la longueur à partir du sommet, largement arrondis aux angles apicaux externes, obliquement tronqués au sommet, en angles obtus aux angles suturaux, environ une fois et un cinquième plus longs que larges dans leur plus grande largeur, ponctués-substriés; stries effacées un peu avant le sommet; intervalles larges, subconvexes, chacun avec une ligne de très petits points; marges latérales finement, les apicales, très finement rebordées. Tergites assez densément et peu fortement ponctués. Dessous du corps un peu plus clair, pubescent sur les derniers sternites; pattes robustes.

Segment supplémentaire de l'abdomen du mâle apical, triangulaire, émoussé à l'extrémité.

— République Argentine, Gob. Misiones (C. Bruch legit).

Collections du Musée de La Plata, C. Bruch et A. Grouvelle.

MACROSTOLOPS n. gen.

Caput oculis maximis, tota capitis latera occupantibus, epistomo porrecto; sulcis antennalibus brevibus, convergentibus; labro parum producto; mandibulis apice simplicibus. Elytra elongata, striata. Abdomen subconicum, sat late marginatum; 4° et 5° segmento expositis, 3° in maxima parte occultato; 2° quam aliis brevior, 1°, 3° et 4° subaequalibus, ultimo longioribus.

Ce genre se place entre les *Brachypeplus* et les *Macrostola*.

Macrostolops inusitatus n. sp.

Suboblongus, postice acuminatus, paulo magis ter longior quam in maxima latitudine latior, modicissime convexus, nitidulus, glaber, testaceus. Antennae subbreves. Caput transversum, antice truncatum, fronte convexiusculum, subdense punctulatum, inter antennarum bases bipunctatum et inter puncta subimpressum; epistomo convexo, antice inflexo, tenuissime punctulato; oculis magnis antennarum basin attingentibus. Prothorax antice quam postice vix angustior, lateribus rotundatus, circitor in maxima latitudine duplo latior quam longior, subdense punctatus; margine antico truncato utrinque vix sinuato; angulis anticis rotundatis tenuissime marginatis; angulis posticis breviter rotundatis; basi arcuata, extra medium

tenuissime marginata. Scutellum subpentagonale, parce tenueque punctulatum. Elytra humeris rotundata, tunc quam prothorax latiora, lateribus modicissime arcuata, subparallela, angulis posticis rotundata, apice oblique retrorsum truncata, circiter $1\frac{1}{5}$ longiora quam simul latiora, punctato-striata; striis paulo ante apicem evanescentibus; striarum intervallis convexis unilineatis, tenue punctulatis; margine apicali breviter inflexa, subtiliter marginata; marginibus lateralibus valde inflexis, tenuiter marginatis. Abdominis segmenta parce punctata. — Long. : 3,5-4 mm.

Suboblong, acuminé vers le sommet de l'abdomen, un peu plus de trois fois plus long que large dans sa plus grande largeur, très modérément convexe, un peu brillant, glabre, testacé légèrement fauve. Antennes presque courtes, massue oblongue, moins d'une fois et demie plus longue que large, symétrique; premier article moins long que les deux suivants réunis; longueur de la massue subégale au cinquième de la longueur totale de l'antenne. Tête presque deux fois plus large au niveau des yeux que longue, tronquée au bord antérieur; côtés parallèles contre ce bord, sinués presque en quart de circonférence en avant des bases des antennes, sinués et divergents vers l'arrière entre les yeux après ces bases, enfin obliquement convergents à partir de la base de l'orbite de l'œil; front médiocrement convexe, presque densément pointillé, séparé de l'épistome par une impression large, peu profonde, terminée de chaque côté, près de la base de l'antenne, par un point enfoncé; épistome modérément convexe, tronqué au bord antérieur et brièvement infléchi, densément et très finement pointillé. Yeux gros, saillants, presque en demi cercle, occupant l'intervalle entre l'insertion de l'antenne et la base de la tête. Prothorax à peine plus étroit en avant qu'à la base, à peine plus large en avant que la tête avec les yeux, arrondi sur les côtés, présentant sa plus grande largeur vers le milieu de la longueur, alors très nettement plus large que la tête, environ deux fois plus large dans sa plus grande largeur que long, presque densément ponctué. Bord antérieur subtronqué, faiblement subsinué de chaque côté; angles antérieurs arrondis, finement rebordés; côtés à peine visiblement subsinués dans la moitié basilaire, bordés comme les angles antérieurs; angles postérieurs brièvement arrondis; base faiblement arquée dans le milieu, plus fortement vers les extrémités, finement rebordée de chaque côté; région des angles postérieurs assez largement subdéprimée. Écusson subpentagonal, plus de deux fois plus large à la base que long, éparsément et très finement pointillé. Elytres subtronqués à la base, arrondis aux épaules, alors nettement plus larges que le prothorax dans sa plus grande largeur, très faiblement arqués sur les côtés, subparallèles, largement arrondis aux angles apicaux externes, obliquement tronqués au

sommet et formant des angles suturaux obtus, environ une fois et un cinquième plus longs que larges, ponctués-striés; intervalles convexes, chacun avec une ligne de très petits points; stries effacées près du sommet, déterminant une étroite marge lisse un peu infléchie, finement rebordée; marges latérales fortement déclives, surtout vers la base, ponctuées en lignes, finement rebordées. Calus huméraux marqués. Tergites éparsément pointillés, finement et éparsément pubescents. Sternites pubescents; pattes robustes.

Segment supplémentaire de l'abdomen du mâle apical, émoussé à l'extrémité; dernier segment sinué.

— Paraguay. Haut Paraná. (Bertoni legit) Plusieurs individus.

Collections du Musée de La Plata, C. Bruch et A. Grouvelle.

Macrostolops singularis n. sp.

Suboblongus, postice acuminatus, circiter quater longior quam in maxima latitudine latior, modicissime convexus, nitidus, glaber, testaceus. Caput transversum, convexiusculum, antice truncatum, subdense punctulatum, inter antennarum bases bipunctatum et inter puncta subimpressum; oculis magnis, antennarum basin attingentibus. Prothorax antice quam postice paulo latior, angulis anticis rotundatus, circiter sesquialtor quam longior, subdense punctulatus; margine antico arcuato; lateribus subrectis, antice cum angulo tenuiter marginatis, postice paulatim sublata explanatis; angulis posticis breviter rotundatis; basi subtruncata, extra medium tenuiter marginata. Scutellum subpentagonale, subtiliter alutaceum et ad latera tenuissime punctulatum. Elytra humeris rotundata, tunc quam prothorax latiora, lateribus subrecta, angulis posticis sat late rotundata, apice oblique retrorsum truncata, circiter $1\frac{1}{3}$ longiora quam simul in maxima latitudine latiora, punctato-substriata; intervallis convexiusculis, tenuissime unilineato-punctulatis; margine apicali breve laevi et inflexa; lateribus stricte, apice strictissime marginatis. Abdominis segmenta subtiliter alutacea, parce tenuiterque punctulata. Corpus subtus subochraceo-testaceum. — Long. 3,5-4 mm.

Suboblong, environ quatre fois plus long que large dans sa plus grande largeur, très modérément convexe, brillant, glabre, testacé légèrement fauve. Massue des antennes oblongue, presque une fois et demie plus longue que large, un peu plus dilatée en dedans qu'en dehors; premier article un peu plus long que le deuxième, longueur de la massue inférieure au quart de la longueur totale de l'antenne. Tête presque deux

fois plus large au niveau des yeux que longue, tronquée au bord antérieur, presque échancrée en quart de cercle de chaque côté, en avant de l'insertion de l'antenne, très faiblement sinuée de chaque côté et élargie vers l'arrière entre les yeux, brusquement un peu rétrécie en arrière de ceux-ci; front légèrement convexe, presque densément pointillé, séparé de l'épistome par une impression transversale, terminé de chaque côté par un point enfoncé; épistome convexe, lisse; yeux gros, occupant le côté de la tête entre sa base et l'insertion de l'antenne. Prothorax faiblement rétréci vers la base, largement arrondi aux angles antérieurs, presque droit sur les côtés, à peu près aussi large à la base que la tête au niveau des yeux, environ une fois et demie plus large dans sa plus grande largeur que long, presque densément pointillé. Bord antérieur arqué; angles antérieurs, côtés et base, sauf les milieux, finement rebordés; marges latérales effacées en avant, progressivement explanées vers la base; angles postérieurs arrondis; base arquée. Ecusson subpentagonal, presque deux fois plus large à la base que long, très finement pointillé sur les marges latérales et apicales. Elytres arrondis aux épaules, alors un peu plus larges que le prothorax dans sa plus grande largeur, presque droits sur les côtés, un peu élargis vers le sommet, largement arrondis aux angles apicaux externes, obliquement tronqués au sommet formant des angles suturaux obtus, environ une fois et un tiers plus longs que larges dans leur plus grande largeur, ponctués, substriés; stries effacées un peu avant le sommet, laissant ainsi une étroite marge lisse, infléchie; intervalles larges, faiblement convexes, chacun avec une fine ligne de points. Marges latérales et apicales très finement rebordées. Tergites très finement alutacés, éparsément et très finement pointillés, à peine visiblement frangés de petits poils dorés au bord apical.

Dessous du corps testacé un peu jaunâtre; abdomen très finement pubescent; pattes robustes.

Segment supplémentaire de l'abdomen du mâle apical, triangulaire; dernier segment chez la femelle brièvement tronqué au sommet, impressionné en dessous contre le bord apical et orné de chaque côté, contre ce rebord, d'un très petit faisceau de poils.

— Paraguay, Villarica (H. Richter legit). Plusieurs exemplaires.

Collections du Musée de La Plata A. Grouvelle et C. Bruch.

Cillaeus (?) expressus n. sp.

Suboblongus, postice modice attenuatus, circiter quinquies longior quam in maxima latitudine latior, modicissime convexus, nitidus, glaber, fulvo-rufus; elytris apice aliquid infuscatis, antennae bre-

ves. Caput fronte vix convexum et dense punctulatum; inter antennarum bases haud profunde impressum: epistomo subdepresso, subtiliter punctulato; oculis antennarum basin haud attingentibus, modicissime prominulis. Prothorax antice quam postice paulo angustior, lateribus arcuatus, circiter in maxima latitudine sesquialtior quam longior, disco punctis geminatis subtiliter punctulatus; margine antico subtruncato; angulis anticis obtusis subhebetatis; lateribus tenuiter marginatis; angulis posticis obtusis hebetatis; basi subarcuata, extra medium tenuiter marginata. Scutellum subtriangulare, transversum, convexiusculum, praecipue ad latera subtilissime punctulatum. Elytra humeris breviter rotundata, tunc quam prothorax in maxima latitudine vix latiora, lateribus subrecta, parallela, angulis posticis rotundata, apice oblique truncata, paulo longiora quam simul latiora, tenuiter striatopunctata; striis paulo ante apicem evanescentibus; intercallis latis planis, unilincato-punctulatis; margine apicali confuse subtilissimeque punctulata, sicut marginibus lateralibus tenuiter marginata. — Long.: 6 mm.

Suboblong, brièvement arrondi à l'extrémité de l'abdomen, environ cinq fois plus long que large dans sa plus grande largeur, à peine convexe, brillant, glabre, roux-fauve un peu foncé, légèrement enfumé vers l'extrémité des élytres. Antennes courtes; massue oblongue, à peine plus longue que large, symétrique, subégale au quart de la longueur totale de l'antenne. Tête moins de deux fois plus large au niveau des yeux que longue, subsinuée au bord antérieur; côtés subparallèles contre le bord antérieur, profondément sinués en avant de l'insertion de l'antenne, brièvement sinués après celle-ci, faiblement sinués, divergents vers l'arrière entre les yeux, très brièvement subparallèles après ceux-ci et enfin convergents vers l'arrière; front à peine convexe, densément ponctué, séparé de l'épistome par une vague impression, accentuée de chaque côté près de la base de l'antenne; épistome subdéprimé, brièvement infléchi en avant et sur les côtés, très finement pointillé sur sa marge basilaire; yeux moyens, peu saillants. Prothorax un peu plus étroit en avant qu'à la base, plus large en avant que la tête avec les yeux, arqué sur les côtés, modérément élargi, présentant sa plus grande largeur vers le milieu de la longueur, environ une fois et demie plus long que large dans sa plus grande largeur; ponctuation formée sur le disque de points espacés, très fins géminés et sur les côtés de points plus forts et serrés; bord antérieur subtronqué; angles antérieurs obtus, légèrement émoussés; côtés finement rebordés; angles postérieurs modérément obtus, émoussés; base subtronquée, largement et finement rebordée de chaque côté; marges des angles antérieurs assez longuement et

brèvement infléchies. Ecusson subtriangulaire, plus de deux fois plus large à la base que long, très finement pointillé sur les côtés. Elytres tronqués à la base, brièvement arrondis aux épaules, subparallèles, à peu près de la même largeur que le prothorax dans sa plus grande largeur, arrondis aux angles apicaux externes, obliquement tronqués au sommet, formant des angles suturaux obtus, un peu plus longs que larges ensemble, finement striés-punctués; stries ponctuées effacées un peu avant le sommet; intervalles larges, plans très finement pointillés en ligne; marge apicale finement rebordée comme les marges latérales, couverte d'une ponctuation extrêmement fine peu serrée, confuse, marges latérales fortement et brusquement infléchies surtout au-dessous des calus huméraux. Tergites assez densément pointillés, premier et deuxième tergites apparents fortement impressionnés de chaque côté contre le bord interne de la marge latérale.

— République Argentine. Gob. Misiones. Un exemplaire.
Collection C. Bruch.

Campsopyga atricolor n. sp.

Suboblonga, postice acuminata, circiter quinquies longior quam in maxima latitudine latior, subconvexa, glabra, nitida, atra; corpore subtus piceo; bucca, antennis tarsisque, dilutioribus. Antennae breves. Caput depressum, antice subsinuatum, fronte dense punctatum, inter antennarum bases utrinque punctatum; epistomo antice laevi, breve inflexo; oculis antennarum basin haud attingentibus, modice prominulis. Prothorax antice quam postice paulo angustior, lateribus antice arcuatus, postice subrectus, retrorsum aliquid, circiter duplo in maxima latitudine latior quam longior, dense punctatus; margine antico truncato; angulis anticis obtusis, hebetatis; lateribus stricte marginatis; angulis posticis obtusis, tenuiter marginatis; basi extra medium truncata, tenuiter marginata. Scutellum extra in longitudinem lineam strictam dense punctulatum. Elytra depressa, basi arcuata, humeris obtuse-hebetato-angulosa, tunc quam prothorax sublitora, lateribus subrecta, aliquid ampliata, angulis posticis rotundata, apice separatim latissime arcuata, subprofunde striato-punctata; stria apicem fere attingentibus; intervallis, strictis, depressis, unilineato-punctulatis; marginibus lateralibus, praecipue basin versus, valde inflexis, strictissime marginatis.

Abdominis segmenta apice tenuiter fulvo marginata, subdense punctulata. — Long. : 6 mm.

Suboblong, acuminé vers le sommet de l'abdomen, environ quatre fois

plus long que large dans sa plus grande largeur, faiblement convexe, déprimé sur les élytres, noir; dessous du corps brun de poix; bouche, antennes et tarsi plus clairs. Antennes courtes; massue oblongue, nettement moins d'une fois et demie plus longue que large, légèrement plus dilatée en dedans qu'en dehors, un peu plus courte que le quart de la longueur totale de l'antenne. Tête moins de deux fois plus large au niveau des yeux que longue, tronquée au bord antérieur; côtés très brièvement parallèles en avant, sinués contre l'insertion de l'antenne, à peine sinués entre celle-ci et l'œil, subtronqués, divergents vers l'arrière entre les yeux, enfin arqués, fortement convergents après les bases des orbites des yeux; front à peine convexe, densément ponctué biponctué impressionné entre les bases des antennes: épistome faiblement convexe, brièvement infléchi contre le bord antérieur, densément et finement ponctué surtout vers ce dernier. Yeux moyens, un peu saillants. Prothorax un peu plus étroit en avant qu'à la base, arrondi sur les côtés, surtout dans la partie antérieure, présentant sa plus grande largeur un peu en avant du milieu, alors très nettement plus large que la tête, environ deux fois plus large dans sa plus grande largeur que long; densément ponctué; bord antérieur subtronqué; angles antérieurs largement arrondis; côtés finement rebordés; angles postérieurs obtus à peine émoussés: base subtronquée et finement rebordée, sauf dans le milieu; marges des angles antérieurs et partie antérieure des côtés fortement et assez brusquement infléchies. Écusson environ deux fois aussi large à la base que long, densément pointillé de chaque côté. Élytres subtronqués à la base, brièvement arrondis aux épaules, alors un peu plus larges que le prothorax dans sa plus grande largeur, très faiblement arqués et élargis sur les côtés, arrondis aux angles apicaux externes, très largement et séparément arrondis au sommet, un peu plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur, ponctués-striés: stries enfoncées, atteignant presque le sommet, intervalles à peu près aussi larges que les stries, chacun avec une ligne de très petits points; marges latérales fortement infléchies, surtout vers la base, finement rebordées; calus huméraux marqués. Tergites finement alutacés, presque densément pointillés, très étroitement bordés de roux au sommet; troisième et quatrième sternites impressionnés de chaque côté.

— Paraguay, Puerto Bertoni, Haut Paraná (Bertoni legit). 3 individus. Collections C. Bruch et A. Grouvelle.

Lobiopa Bruchi n. sp.

Oblonga, circiter duplo longior quam latior, modice convexa, vix nitida, dense tenuisque flavo-cinereo pubescens, setis erectis, albidis et

nigris, in elytris lineato-dispositis intermixtis; nigro brunnea ochraceo-testaceo variegata. Antennae graciles; 1° articulo valde anguloso-dilatato. Caput utrinque ante-oculos sat valde lobatum, his parce brevissimeque setosis. Prothorax antice profunde emarginatus, disco ante basin, transversim quadri-subimpressus; basi tenuiter marginata. Elytra humeris obtuse angulosa, vix perspicue dentata, apice separatim breviter rotundata; lateribus sat late explanato-reflexis; disco ochraceo-testaceo variegato, praecipue post medium macula transversa ornato. Corpus subtus nigro brunneum. — Long. : 3,5-4 mm.

Oblong, environ deux fois plus long que large, modérément convexe, faiblement brillant, couvert d'une vestiture double, comprenant une pubescence flave-cendrée, fine, couchée, serrée et des soies noires ou blanchâtres, dressées, un peu inclinées en arrière; peu espacées, confuses, sur la tête et le prothorax, disposées en lignes sur les élytres. Couleur brun noirâtre, variée de taches jaunes, testacées, très légèrement rembrunies; massue enfumée; premier article fortement saillant, anguleux au bord interne, troisième presque quatre fois plus long que large. Tête très transversale, déprimée sur le front, assez fortement lobée de chaque côté, par suite nettement et assez profondément sinuée entre les lobes antéoculaires et le bord antérieur de l'épistome; yeux présentant sur le milieu de leur convexité, quelques petites soies dressées. Prothorax rétréci en avant, à peine à la base, arqué sur les côtés, très nettement, plus de deux fois plus large dans sa plus grande largeur que long dans sa plus grande longueur, fortement échancré au bord antérieur, rembruni sur le disque, jaunâtre et largement réfléchi-explané sur les côtés; soies foncées groupées sur le disque, soies claires sur les marges latérales; disque marqué transversalement, sur la moitié basilaire, de quatre impressions peu accentuées et sur la moitié antérieure de deux impressions encore plus faibles; base très étroitement rebordée. Écusson très transversal, arrondi au sommet, glabre, densément et très finement ponctué. Elytres en angle obtus, à peine denté aux épaules, arqués sur les côtés, séparément et très brièvement arrondis au sommet, assez largement réfléchis-explanés sur les côtés, brun-noirâtres, variés de petites taches linéaires, un peu plus foncées, portant les soies sombres et de taches claires comprenant principalement au delà du milieu, une assez grande tache transversale; de chaque côté de l'écusson contre la base, une petite tache claire. Dessous du corps brun noirâtre, densément et finement ponctué, très brièvement et densément pubescent.

— Province de Buenos Aires (C. Bruch legit). Plusieurs exemplaires. Collections du Musée de La Plata, C. Bruch et A. Grouvelle.

Pocadius glaber n. sp.

Breviter oblongus, convexus, nitidus, glaber, aër; antennis fulvo-testaceis; prothoracis basi utrinque stricte et elytrorum basi late fulvo-rufis. Caput subdepressum, subdense punctulatum. Prothorax transversus, antice angustatus, disco punctulatus; margine antico late et haud profunde emarginato stricte marginato; angulis anticis late rotundatis; lateribus antice valde rotundatis, posticis rectis, antrorsum sat convergentibus; angulis posticis hebetatis; basi arcuata, ab utroque parte scutelli breve subsinuata. Scutellum subtriangulare, basin versus magis valde punctulatum. Elytra lateribus arcuata subampliata, apice separatim latissime subrotundata, tam elongata quam simul in maxima latitudine lata, tenuiter punctato-substriata; linearum intervallis latis, dense tenuiter punctulatis; striis suturalibus ad apicem indicatis. Corpus subtus dilute piceum.
— Long. : 3-4 mm.

Oblong, environ une fois et deux tiers plus long que large dans sa plus grande largeur, convexe, brillant, glabre, noir; antennes fauve-testacé; base du prothorax étroitement bordée de roux aux extrémités; moitié basilaire des élytres de la même couleur; dessous du corps brun de poix; très peu foncé; pattes et épipleures des élytres plus clairs. Antennes courtes; sixième à huitième articles très transversaux, huitième amorçant presque la massue; celle-ci oblongue, compacte, deuxième article plus court que les deux autres, dernier un peu plus long que le premier. Tête très transversale, légèrement convexe sur le front, déprimée sur l'épistome, un peu relevée de chaque côté vers la base de l'antenne, densément pointillée sur le front, sinuée au bord antérieur, sinuée de chaque côté jusqu'aux yeux, ceux-ci échancrant les marges latérales du front. Mandibules fortement recourbées; labre nettement visible, profondément sinué. Prothorax rétréci en avant, environ deux fois et demie plus large à la base que long, moins fortement ponctué sur le disque que la tête, ponctué à peu près comme celle-ci vers les côtés; bord antérieur largement et peu profondément échancré, finement rebordé; angles antérieurs largement arrondis; côtés fortement arqués dans la partie antérieure, presque droits, assez convergents en avant dans la partie basilaire; angles postérieurs émoussés; base arquée, brièvement sinuée de chaque côté de l'écusson, bordée aux extrémités par une étroite marge lisse; bords latéraux étroitement rebordés, région des angles postérieurs légèrement réfléchi. Écusson subtriangulaire, environ deux fois plus large à la base que long, à peine visiblement alutacé, couvert d'une ponctuation fine à la base, s'atténuant et s'espacant vers le sommet. Élytres

subtronqués à la base, de la largeur de la base du prothorax, en angles modérément obtus aux épaules, arrondis sur les côtés, à peine élargis, très largement et séparément arrondis au sommet; environ aussi longs que larges dans leur plus grande largeur, finement ponctués; stries un peu irrégulières vers le sommet; intervalles des stries finement et densément pointillés; bords latéraux étroitement rebordés, sommet encore plus étroitement; stries suturales légèrement marquées au sommet. Pygidium très densément pointillé. Poitrine et abdomen présentant une pubescence dorée, éparsée; extrémités internes des hanches postérieures et de leurs trochanters décorées chacune d'un petit faisceau pubescent. Angles apicaux externes des tibias saillants en angle aigu.

— République Argentine. Province de San Luis, Alto Pencoso (C. Bruch). Province de Santiago del Estero. Plusieurs exemplaires.

Collections du Musée de La Plata, C. Bruch et A. Grouvelle.

Amphicrossus vicinus n. sp.

Oblongus, paulo magis duplo longior quam latior, modice convexus, nitidus, piceus, antennis, clava infuscata excepta, pedibusque dilutior, dense flavo pubescens; pubescentia in elytrorum disco subtenui pilis longioribus subincrassatis, retrorsum valde incurvato-deflexis, ad latera magis multis intermixta. Antennae subgraciles. Caput dense punctatum. Prothorax angulis posticis rotundatus, in maxima latitudine paulo duplo latior quam longior, alutaceus, subdense punctatus; marginibus lateralibus sublata concavo-reflexis, brevis ciliatis; basi medio truncata, vix producta. Elytra longiora quam simul in maxima latitudine latiora, apice separatim latissime rotundata, vix perspicue alutacea, subparce punctata; punctis ab basin fere tenuibus, apicem versus attenuatis; marginibus lateralibus longe ciliatis. Apud marem abdominis ultimum segmentum subtruncatum medio lobo minimo, nitido et producto instructum; elytrorum fasciculi ante medium et haud juxta suturam positi. — Long. : 4,5-4,7 mm.

Oblong, un peu plus de deux fois plus long que large dans sa plus grande largeur, modérément convexe, brillant, brun de poix; antennes et pattes brun rougeâtre clair, massue des antennes enfumée; pubescence flave, plutôt serrée, plus fine sur le disque des élytres, entremêlée sur celles-ci de poils plus longs, plus épais, arqués vers l'arrière, fortement couchés, plus nombreux sur les marges latérales. Antennes presque grêles; massue environ une fois et demie plus longue chez le mâle que chez la femelle, nettement plus courte que les articles trois à huit.

pris ensemble. Tête convexe sur le front, densément ponctuée, finement alutacée; yeux presque saillants en demi-cercle. Prothorax moins de deux fois plus large à la base que long dans sa plus grande longueur; largeur maxima vers le premier quart de la longueur à partir de la base; tégument alutacé; ponctuation moins forte et plus éparsée que celle de la tête; angles antérieurs obtus; marges latérales assez largement réfléchies, subconcaves, brièvement ciliées; angles postérieurs arrondis; base très légèrement saillante en arrière dans le milieu, bordée par une très étroite marge, arquée, infléchie. Écusson petit, subtriangulaire, très transversal. Élytres anguleux aux épaules, un peu plus longs que larges ensemble à la base, très largement et séparément arrondis au sommet, très finement et à peine visiblement alutacés, plus finement ponctués que le prothorax, longuement ciliés sur les côtés. Mâle: dernier sternite subtronqué, présentant au milieu un petit lobe saillant, subcarré, brillant. Fascicules des élytres placés avant le milieu par rapport à la base, relativement éloignés de la suture.

Province de Buenos-Aires (C. Bruch legit). Un mâle et une femelle. Collection C. Bruch.

Cryptarcha castanescens n. sp.

Ovata, convexa, nitida, pube-flavo-ochracea vestita, sulfureo castanea; capite antice, prothoracis marginibus, antennis pedibusque dilutioribus. Antennae subgraciles; clava ovata apicem versus subangustata. Caput transversissimum, subdepressum, subdense punctatum, punctis apicem versus paulatim attenuatis; margine antico subarcuato, medio breviter vix sinuato. Prothorax transversus subparallelus, subdense punctatus; angulis anticis, antrorsum posticis breviter retrorsum modice productis; basi late subtruncata, ab utraque parte scutelli breviter subsinuata. Scutellum transversum, subtriangulare laeve. Elytra circiter $1\frac{1}{4}$ longiora quam simul latiora, humeris breviter oblique truncata, apice separatim obtuse acuminata, dense lineato-punctata et lineato-pubescentia; lineis alternis vix validioribus; punctis apicem versus attenuatis. — Long.: 3,8 mm.

Ovale, environ deux fois et demi plus long que large dans sa plus grande largeur; convexe, brillant, marron un peu enfumé; marge antérieure de la tête, bords marginaux du prothorax, antennes et pattes rougâtres; pubescence flave-dorée, peu serrée, couchée, plus longue sur les côtés du prothorax et sur la partie antérieure des marges latérales des élytres. Antennes courtes légèrement épaissies; premier article épais, plus de deux fois plus long que large; deuxième moins épais, environ

une fois et demie plus long que large; troisième encore un peu épais, presque deux fois plus long que large; quatrième à huitième progressivement un peu épaissis, quatrième à sixième subcarrés, cinquième un peu plus long que le quatrième et le sixième, septième et huitième subtransversaux, neuvième à onzième formant une massue ovale, un peu atténuée vers l'avant, presque deux fois plus longue que large, dont le premier article est en forme de tronc de cône renversé; le deuxième un peu plus transversal que le premier, est sinué au sommet et le troisième très nettement moins long que large, est terminé par une partie conique, très surbaissée. Tête subtriangulaire, arrondie en avant, plus de deux fois plus large au niveau des yeux que longue, subdéprimée, couverte d'une ponctuation presque dense, atténuée vers l'avant; marge antérieure brièvement infléchie, impressionnée au milieu; labre caché, yeux un peu saillants, à convexité plus accentuée vers l'arrière. Prothorax rétréci en avant, arrondi dans la partie antérieure des côtés, subparallèle dans la partie basilaire, nettement plus de deux fois plus large à la base que long, sensiblement ponctué comme la tête, plus fortement vers la région des angles antérieurs; bord antérieur vu de dessus peu profondément échancré, arqué en avant; angles antérieurs vus de dessus très largement aigus, vus de face presqu'arrondis, finement rebordés comme les côtés, ceux-ci bordés par une très étroite marge concave; angles postérieurs un peu saillants en arrière, vus de dessus aigus, vus de face un peu obtus; base largement subtronquée, brièvement sinuée de chaque côté de l'écusson. Écusson petit, subtriangulaire, très transversal, lisse. Élytres subtronqués à la base, brièvement et obliquement tronqués aux épaules, arqués sur les côtés, à peine élargis, subacuminés séparément au sommet, densément ponctué en lignes; lignes alternes très légèrement accentuées, substriées, points atténués contre le sommet; ponctuation confuse sur les régions humérales; pubescence formant, sur les lignes de points, des lignes alternativement, à peine accentuées. Stries suturales à peine marquées au sommet. Marges latérales étroitement rebordées.

— République Argentine. Province de Buenos-Aires. Un exemplaire mâle.

Collection A. Grouvelle.

Je rapporte à cette espèce un exemplaire femelle provenant de la province de Tucumán, conservé dans la collection C. Bruch.

Cet insecte a une forme plus trapue et une tête plus large; les antennes plus grêles et plus allongées sont terminées par une massue assombrie et les élytres sont arrondis séparément au sommet.

OSTOMIDAE

Ancyrona argentina n. sp.

Oblonga, circiter 2 1/2 longior quam in maxima latitudine latior, modice convexa, nitidula, flavo-pubescentis, fulvo-ferruginea. Antennae breves; clava elongata, intus subvalde dilatata. Caput fronte convexiusculum, dense punctatum, antice late subsinuatum. Prothorax transversissimus, antice modice, postice vix angustatus, in disco plus minusve parce, ad latera densius punctatus; margine antico late profundeque emarginato; angulis anticis antrorsum productis, hebetatis; lateribus arcuatis, substrictis concavo-marginatis; basi medio breve et utrinque late subsinuata; pilis pubescentiae elongatis, stratis, ad latera magis densatis. Elytra disco depressa, subparallela, apice conjunctim rotundata, circiter 1 1/3 longiora quam simul latiora, punctato-lineata, vix striata; intervallis alternis paulo latioribus, vix elevatis; setis pubescentiae arcuatis, valde inflexis. — Long. : 3,5 mm.

Oblong, environ deux fois et demie plus long que large dans sa plus grande largeur, modérément convexe, déprimé sur le disque des élytres, un peu brillant, fauve ferrugineux; pubescence flave longue et couchée sur la tête et le prothorax, plus courte, sétiforme arquée en arrière et disposée en lignes sur les élytres. Antennes courtes; massue nettement plus longue que le tiers de la longueur totale de l'antenne, assez fortement dilatée en dedans, premier et deuxième articles très transversaux, dernier plus long que les précédents, subacuminé dans la partie apicale. Tête un peu plus de deux fois plus large que longue, convexe sur le front, tronquée et sinuée de chaque côté au bord antérieur, densément ponctuée; points plutôt gros, modérément profonds. Bord antérieur bordé par une étroite marge déprimée, lisse, limitée en arrière par une fine strie arquée, présentant en avant une ligne de petits points; labre saillant, subrectangulaire, relevé en bourrelet au bord antérieur. Yeux à peine saillants, coupés transversalement au bord postérieur. Prothorax rétréci en avant à peine à la base, arqué sur les côtés, nettement plus de deux fois plus large, dans sa plus grande largeur que long, à peine visiblement chagriné, couvert d'une ponctuation plus forte que celle de la tête, espacée sur le disque, surtout vers la base, plus serrée vers les côtés. Bord antérieur profondément échancré, étroitement rebordé, sauf au milieu; angles antérieurs saillants en avant, émoussés; marges latérales fortement infléchies bordées par une marge réfléchie densément

ponctuée, étroite et concave en avant, plus large vers la base; angles postérieurs obtus; base brièvement subsinuée au milieu, largement de chaque côté, rebordée seulement aux extrémités. Écusson transversal, arrondi au sommet, transversalement subplié, marqué de quelques points à la base. Élytres obliquement tronqués à la base près des épaules, celles-ci en angles obtus, émoussés, parallèles, arrondis ensemble au sommet, environ une fois et deux tiers plus longs que larges ensemble, ponctués en lignes; intervalles alternes des lignes ponctués un peu plus larges, subélevés: points des lignes rapprochés groupés deux à deux obliquement; soies infléchies légèrement sur l'intervalle large. Marges latérales fortement infléchies, bordées par une étroite cannelure.

Gob. Misiones. Un exemplaire.

Collection C. Bruch.

COLYDIIDAE

Prolyctus iridescens n. sp.

Ovatus, circiter $4\frac{1}{2}$ longior quam in maxima latitudine latior, convexus, nitidus, glaber, ater, leviter subcyaneus iridescens. Antennae subincrassatae, 1° articulo arcuato, apice oblique truncato. Caput fronte convexiusculum, plus minusve subdense profundeque punctatum. Prothorax subtranversus, antice quam postice vix latior; margine antico arcuato, ad extremitates valde sinuato; angulis anticis antrorsum acuto-productis, lateribus ad longitudinis primam quartam partem obtuse angulosis, antice posticeque vix undulatis, juxta angulis posticis brevis valdeque sinuatis, pulvinato-marginatis; angulis posticis extus hebetato-productis; basi ante scutellum truncata, utrinque oblique vix sinuata; disco subdense et quam capite minus valde punctato, medio late excavato; excavatione antice latiore et profundiore, lateribus trisinuato, cum basi tribus sulcis juncto, ima parte vix punctato. Scutellum minimum, suboblongum. Elytra ad basis extremitates oblique truncata, humeris dentata, lateribus arcuata, vix ampliata, ad apicem brevis subreflexa, dein profunde sinuata et apice separatim obtuse acuminata, polita; singulo elythro in disco sexies striato; intervallis alternis elevatis: 1° suturali, solum juxta-basin; 2° integro paulo ante apicem obtuse breveque anguloso-elevato et dein abrupte in verticem terminato; 3° subintegro, apice obtuse anguloso-elevato et abrupta in verticem terminato; 4° humerali; 5° simili. — Long.: 5-5,5 mm.

Ovale, environ quatre fois et demie plus long que large dans sa plus grande largeur, convexe, glabre, noir avec un léger reflet irisé, bleuâtre. Antennes un peu épaisses; premier article épais, arqué en dedans, obliquement tronqué à l'extrémité; deuxième encore un peu épais, subcarré; troisième subcarré; quatrième à neuvième progressivement et très faiblement épaissis; quatrième à septième subcarrés, huitième à neuvième suballongés; dixième en forme de tronc de cône renversé, brusquement plus large; onzième transversal, subcylindrique, nettement plus étroit que le précédent. Tête faiblement transversale, légèrement convexe sur le front, profondément et plus ou moins densément ponctuée vers la base, plus densément et plus finement en avant; bord antérieur tronqué au milieu, faiblement sinué en avant des yeux, ceux-ci peu saillants, échançant fortement les marges du front à facettes assez fortes. Prothorax plus large que la tête, à peine plus large en avant qu'à la base, légèrement transversal, assez densément et finement ponctué sur ses parties saillantes, lisse au fond des impressions creusées sur le disque. Bord antérieur arqué au milieu, brièvement sinué de chaque côté contre les extrémités; angles antérieurs aigus, un peu saillants en avant; côtés formant un angle largement obtus, émoussé, vers le premier quart de la longueur à partir du sommet, à peine ondulés en avant et en arrière de cet angle, fortement et brièvement sinués contre l'angle postérieur, bordés par un assez fort bourrelet un peu irrégulier, et une très étroite marge concave; angles postérieurs saillants latéralement, en forme de dent émoussée; base tronquée devant l'écusson, obliquement subsinuée de chaque côté. Disque creusé d'une forte et large impression, plus étroite en avant qu'à la base, limitée sur les côtés par une marge trisinuée et à la base par une partie arquée en avant, séparée de la base du prothorax par un lobe traversé par un sillon longitudinal et limité sur les côtés par des sillons obliques, convergents en avant. Impression coupée en avant, par un fort sillon transversal, séparant en avant une partie se raccordant progressivement avec la surface du disque, longitudinalement subélevée au milieu, et en arrière un lobe subtriangulaire élevé sur le fond de l'impression, limité par des larges sillons devenant plus profonds vers la base. Écusson petit, suboblong, enfoncé. Élytres arqués séparément de chaque côté de l'écusson, obliquement subtronqués entre l'angle postérieur du prothorax et l'épaule, dentés à l'angle huméral, arqués sur les côtés, à peine élargis, très brièvement et très légèrement réfléchis avant l'extrémité, puis profondément sinués en quart de cercle, brièvement subparallèles et enfin subarrondis séparément au sommet, environ trois fois plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur. Disque de chaque élytre marqué de six stries limitant des intervalles alternes plus étroits, plus ou moins élevés, réunis deux à deux à la base; premier intervalle sutural, assez fortement élevé

dans la région scutellaire, très légèrement dans la partie apicale; deuxième modérément élevé, se relevant en dent obtuse vers l'extrémité, puis s'infléchissant verticalement et rejoignant l'extrémité de l'élytre; troisième semblable au deuxième mais n'atteignant pas le sommet; quatrième semblable au troisième; marges latérales de chaque élytre présentant une carène élevée se réunissant à la bordure marginale; sommet de l'élytre terminé par une forte dépression concave, limitée par les carènes discoïdales et marginales. Dessous du corps brun de poix, assez densément et fortement ponctué sur le mésosternum, finement et éparsément sur le métasternum et l'abdomen. Premier segment de l'abdomen coupé longitudinalement de chaque côté, par une double ligne fémorale formée en dedans par le prolongement de la ligne marginale de l'intervalle des hanches, et en dehors par le prolongement de la ligne marginale de ces hanches.

Chaco de Santiago del Estero et province Salta. Deux exemplaires. Collections A. Grouvelle et C. Bruch.

Lithophorus tuberosus n. sp.

L. succineo Pasc. et *praecipue* Fryi Grouv. affinis; parce tenueque aureo-subsquamosus; prothorace transverso, ante medium basin versus aliquid angustato, post medium subparallelo; disco quadriimpresso; prima impressione discoidali, oblonga, maxima; tribus aliis approximatis, valde impressis, in marginem basilari, externis valde oblongis, intermedia minima; intervallis inter impressiones valde carinatis, antice et praecipue juxta basin elevatis; elytrorum intervallis alternis valde tuberosis. — Long. : 5,5-6,5 mm.

Ovale, un peu plus de trois fois plus long que large dans sa plus grande largeur, épais, convexe, déprimé sur le disque des élytres, noir, opaque, parsemé de très petites soies squamiformes dorées. Antennes brunes, un peu plus claires vers l'extrémité, s'épaississant progressivement; dernier article très nettement plus court et plus étroit que le précédent. Tête faiblement transversale, déprimée, assez densément subsquameuse un peu infléchie sur l'épistome, sinuée au bord antérieur; ponctuation plutôt forte, peu serrée, superficielle; deux vagues impressions sur l'occiput. Prothorax médiocrement transversal, subparallèle dans la moitié antérieure, modérément rétréci vers la base dans la moitié basilaire, subondulé sur les côtés, traversé dans la longueur par deux très fortes carènes latérales arquées en dehors en avant, tangentes au bord antérieur, brièvement et fortement atténuées un peu en avant du milieu, se

relevant en forme de gibbosité et rejoignant l'angle postérieur correspondant. Bord antérieur subtronqué, relevé en bourrelet entre les carènes latérales, sinué, réfléchi en arrière en dehors de celle-ci; marge du bord antérieur présentant au milieu, contre le bord, une courte carène longitudinale émoussée. Angles antérieurs aigus, fortement émoussés, un peu saillants en avant. Côtés faiblement sinués en avant et en arrière, bordés par un faible bourrelet et par une marge subexplanée qui s'étend sur toute la région de l'angle antérieur, puis s'atténue et s'efface vers le milieu de la longueur; marges entre le bord latéral et la carène latérale correspondante couvertes d'une grosse ponctuation peu serrée, superficielle, et armées au milieu, un peu en avant de la gibbosité de la carène latérale, d'une gibbosité allongée, dentiforme, brusquement découpée en avant, moins fortement en arrière, largement subsillonée dans cette partie et bordée en avant et en dehors par un sillon peu enfoncé. Angles postérieurs droits, émoussés. Base arquée en arrière au milieu, sinuée de chaque côté. Disque du prothorax présentant un ensemble de reliefs et d'impressions (relief discoïdal) de forme générale trapézoïdale, appuyé sur la base par son côté large, s'arrêtant vers le dernier tiers de la longueur à partir du sommet, bordé en avant et sur les côtés par une légère saillie subcaréniforme émoussée, étroitement anguleuse, vers l'arrière au bord antérieur, sinuée sur les côtés, plus accentuée contre la base, bordée en dedans par une strie nettement marquée, enfermant quatre impressions lisses, une antérieure et trois basilaires : l'antérieure large, peu profonde, subcordiforme, se réunissant par sa partie en pointe à l'impression intermédiaire basilaire; celle-ci plus profonde, présentant au milieu un très gros point enfoncé; impressions externes allongées, oblongues, également plus profondes que l'impression antérieure, marquées en avant par un très gros point enfoncé. Impressions basilaires séparées par deux carènes sublongitudinales, bordant en avant l'extrémité de l'impression antérieure, se réunissant à la base contre l'écusson, soudées chacune avant l'extrémité à une carène arquée, oblique, qui rejoint l'angle basilaire du relief discoïdal, en enfermant l'impression basilaire correspondante. Intervalles entre les carènes latérales et le relief discoïdal grossièrement et peu profondément ponctués. Écusson ovale, convexe. Élytres sinués à la base contre le prothorax, obliquement tronqués aux extrémités, en angles obtus, émoussés aux épaules, subparallèles, longuement atténués vers le sommet, fortement sinués avant l'extrémité, terminés chacun au sommet en dehors par une partie transversale et en dedans par une saillie anguleuse très émoussée, environ deux fois et un quart plus longs que larges ensemble, assez profondément, assez finement striés-ponctués. Intervalles suturaux un peu relevés vers la suture, dans la partie basilaire, formant au sommet des saillies anguleuses apicales, chargées d'une ligne

de très petites gibbosités portant chacune une squamule dorée; stries suturales devenant de véritables sillons enfoncés vers le sommet, s'effaçant avant de l'atteindre; deuxième et quatrième intervalles discoïdaux chargés de fortes saillies gibbeuses, allongées, moins serrées, et plus fortes sur les deuxième intervalles que sur les quatrième; sixième intervalles huméraux, moins fortement gibbeux, septième latéraux encore moins; gibbosités des intervalles s'arrêtant vers le sommet, au niveau de la sinuosité apicale; gibbosités basilaires et apicales plus accentuées. Marges latérales denticulées.

Grand Chaco, Santiago del Estero. Plusieurs exemplaires.

Collections Musée de La Plata et A. Grouvelle.

Cerylon Wagneri n. sp.

Regulariter oblongum, convexum, nitidum, glabrum, castaneum; antennis pedibusque dilutioribus. Antennae subincrassatae, 9 articolatae; 2° articulo subquadrato, 3° cum praecedente subaequali, clava globosa. Caput transversum, antice truncatum, fronte subdense punctulatum, inter antennarum bases striatum, epistomo sublaeve. Prothorax antice angustatus, lateribus arcuatus, juxta basin parallelus, transversus, in disco quam caput minus dense sed magis valide punctatus; margine antico vix emarginato; lateribus pulvinate-marginatis; angulis posticis subobtusis; basi arcuata, ante scutellum breve retrorsum producta et impresso-marginata; disco ante medium extrinseque impresso; marginibus lateralibus valde inflexis. Scutellum transversissimum, apice latissime obtusum. Elytra humeris angulosa, vix perspicue hebetata, lateribus arcuata, vix ampliata, apice conjunctim breviter rotundata, circiter sesquilongiora quam simul in maxima latitudine latiora, lineato-punctata; lineis ad apicem attenuatis; linea suturali et 1^a dorsali tenuibus, 2^a-6^a paulatim magis impressis et praecipue at basin magis striatis; intervallis juxta suturam planis, aliis subconvexis, confuse et plus minusve parce punctulatis; lateribus stricte pulvinate margine. — Long.: 2,2 mm.

Régulièrement ovale et convexe, environ plus de deux fois et demie plus long que large dans sa plus grande largeur, brillant, glabre, marron; pattes et antennes plus claires. Antennes de neuf articles, un peu épaisses; premier article très épais, dilaté-arrondi, en dedans, environ aussi long que large; deuxième un peu épais, subcarré; troisième à huitième progressivement un peu épaissis; troisième subégal au deuxième, les autres serrés, progressivement plus transversaux; neuvième subglo-

buleux, environ trois fois plus large que le précédent, terminé par une petite calotte pubescente. Tête plus de deux fois plus large que longue, tronquée en avant, convexe, presque densément pointillée sur le front, striée entre les bases des antennes; épistome transversalement convexe, très finement pointillé; yeux moyennement saillants, bords des orbites très convergents en avant. Prothorax rétréci en avant, arqué sur les côtés, parallèle contre la base, presque deux fois aussi large à la base que long, moins densément et un peu plus fortement ponctué que le front. Bord antérieur vu de dessus à peine échancré; angles antérieurs obtus, presque arrondis, côtés bordés par une strie et un étroit bourrelet; angles postérieurs presque droits, à peine émoussés; base arquée, un peu saillante en arrière, étroitement explanée devant l'écusson; disque impressionné de chaque côté en avant du milieu. Écusson très transversal, en angles extrêmement obtus au sommet. Élytres subtronqués à la base, légèrement sinués ensemble dans la région scutellaire, en angles presque droits à peine émoussés aux épaules, arqués sur les côtés, à peine élargis, brièvement arrondis ensemble au sommet, un peu plus d'une fois et demie plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur, ponctués en lignes. Sur chaque élytre, ligne suturale et première dorsale fine, deuxième à quatrième dorsales progressivement plus accentuées, devenant de véritables stries, toutes atténuées vers le sommet; intervalles plans vers la suture, plus subconvexe, finement, confusément et peu densément pointillés. Marges latérales pliées, laissant voir de dessus le bord latéral, finement ponctuées en ligne, bordées par une strie et par un bourrelet s'arrêtant à l'épaule.

République Argentine (C. Bruch), deux exemplaires.

Collections C. Bruch et A. Grouvelle.

Cerylon patens n. sp.

Oblongum, sat latum, modicissime convexum, nitidum, glabrum, castaneum; antennis pedibusque dilutioribus. Antennae subincrassatae, 2° articulo subquadrato, cum 3° subaequali; clava subglobosa. Caput transversum antice arcuatum; fronte transversim convexa, dense punctata; epistomo subconvexo, brevi, sublaevi; oculis modice prominulis. Prothorax antice angustatus, transversissimus, in disco parce subtiliterque, a latera densius validiusque punctulatus; margine antico truncato; angulis anticis hebetato-obtusis; lateribus antice arcuatis, postice subrectis, parallelis; angulis posticis subrectis; basi medio retrorsum producta, utrinque subtruncata; marginibus lateralibus prope latus et juxta basin in longitudinem valde lateque impressis; margine laterali inter scutellum et impressionem

lateralum late et haud profunde impresso. Scutellum transversissimum, apice latissime obtusum. Elytra humeris rotundata, lateribus arcuata, vix ampliata, conjunctim vix rotundata, circiter $1\frac{1}{3}$ longiora quam simul in maxima latitudine latiora, disco tenuiter lineato-punctata, ad latera paulatim validius striato-punctata; lineis et striis basin versus minus impressis; lateribus stricte pulvinato-marginatis. — Long.: 1,7 mm.

Oblong, un peu plus de deux fois plus long que large dans sa plus grande largeur, médiocrement convexe, brillant, glabre, marron, bouche, antennes et pattes plus claires. Antennes un peu épaisses; premier article plus épais, modérément dilaté, arrondi en dedans; deuxième encore un peu plus épais, subcarré, troisième subégal au deuxième, quatrième à neuvième progressivement un peu épaissis, dixième subglobuleux, environ trois fois plus large que le précédent, terminé par une petite calotte pubescente. Tête plus de deux fois plus large que longue, arrondie en avant, transversalement convexe et densément pointillée sur le front, convexe et très finement pointillée sur l'épistome; yeux modérément saillants, bords de leurs orbites assez convergents en avant. Prothorax assez rétréci en avant, arqué sur les côtés dans la partie antérieure, droit, subparallèle dans la partie basilaire, un peu plus de deux fois plus large à la base que long, éparsément et très finement ponctué sur le disque, plus densément et plus fortement sur les côtés; bord antérieur tronqué; angles antérieurs obtus, émoussés; côtés bordés par une strie et un fin bourrelet; angles postérieurs presque droits; base un peu saillante en arrière dans le milieu, longuement subsinuée de chaque côté, en partie rebordée par une ligne de petits points serrés; de chaque côté du disque, une impression longitudinale, large et profonde, partant de la base, séparée du bord latéral par une étroite marge, convexe, atteignant environ le troisième quart de la longueur à partir de la base; sur la marge basilaire, de chaque côté de l'écusson, deux impressions larges, peu profondes. Écusson très large, extrêmement obtus au sommet. Élytres subarqués séparément à la base, subanguleux aux épaules, arqués sur les côtés, à peine élargis, arrondis ensemble au sommet, environ une fois et un tiers plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur, ponctué en lignes effacées près du sommet; lignes suturales et première dorsale fines surtout à la base, deuxième à cinquième dorsales progressivement plus marquées, cinquième dorsale effacée sur le calus huméral, devenant confuse vers le dernier tiers de la longueur; intervalles internes plans, externes subconvexes, tous à peine visiblement pointillés; intervalle entre la quatrième et la cinquième strie marqué d'une ligne de points comparables à ceux de la quatrième ligne, effacée sur le calus huméral, devenant confuse en même temps que la

cinquième ligne. Marges latérales fortement infléchies, pliées, très finement ponctuées en lignes, bordées par une strie et un bourrelet visibles lorsque l'insecte est examiné de dessus. Des stries fémorales sur le premier segment de l'abdomen. Mésosternum se développant à partir du sommet, dans le plan du métasternum; saillie prosternale large, infléchie.

République Argentine, Gob. Misiones (Richter legit). Un individu.

Collection C. Bruch.